

苞片;花小,白色,近无梗;萼片长圆状椭圆形,开展,基部不成囊状;花瓣匙形,长为萼片的2倍,具爪;侧蜜腺成对,小,无中蜜腺;子房有多数胚珠,花柱微小,具短头状柱头。短角果长圆形,压扁,常稍旋转,2室,稍开裂,具龙骨状突起但无翅;果瓣膜质,无毛至稍有毛,脉不显明,隔膜窄椭圆形,膜质。种子每室10—16个,长圆状椭圆形,红棕色;子叶背倚胚根。

2种,分布中国、蒙古、中亚及喜马拉雅地区。我国有1种。

本属模式种: 藏芥 *Hedinia tibetica* (Thoms.) Ostenf. (*Hutchinsia tibetica* Thoms.).

1. 藏芥(中国高等植物图鉴) 图版 18:1—3

Hedinia tibetica (Thoms.) Ostenf. l. c. 77. t. 1. f. 2. 1922; N. Busch in Kom. Fl. URSS 8: 547. 1939; 中国高等植物图鉴 2:42. 图 1814. 1972; Jafri, Fl. West Pakist. 55: 92. f. 10 a et t. 2. f. 37. 1973. — *Hutchinsia tibetica* Thoms. in Hook. Icon. Pl. 9: t. 900. 1852. — *Capsella thomsonii* Hook. f. in Journ. Linn. Soc. Bot. 5: 172. 1861. — *Smelowskia tibetica* (Thoms.) Lipsky in Acta Hort. Pétrap. 23: 76. 1904.

多年生草本,全株有单毛及分叉毛;茎铺散,基部多分枝,长5—15厘米。叶线状长圆形,长6—25厘米,羽状全裂,裂片4—6对,长圆形,长5—10毫米,宽3—5毫米,顶端急尖,基部楔形,全缘或具缺刻;基生叶有柄,上部叶近无柄或无柄。总状花序下部花有1羽状分裂的叶状苞片,上部花的苞片小或全缺,花生在苞片腋部,直径约3毫米;萼片长圆状椭圆形,长约2毫米;花瓣白色,倒卵形,长3—4毫米,基部具爪。短角果长圆形,长约1厘米,宽3—5毫米,压扁,稍有毛或无毛,有1显著中脉,花柱极短;果梗长2—3毫米。种子多数,卵形,长约1毫米,棕色。 花果期6—8月。

产甘肃、青海、新疆、四川(石渠)、西藏。生在高山山坡、草地及河滩。苏联、蒙古、印度、尼泊尔、巴基斯坦也有分布。模式标本采自西藏西部。

22. 薄果芥属——*Hymenolobus* Nutt.

Nutt. in Torr. et Gray, Fl. North Amer. 1: 117. 1838; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 457. 1936.

一年生小草本;茎斜倚,少有直立或近直立,无毛,少数有疏生2叉分叉毛。叶远离,匙形、椭圆形或倒披针形,羽状半裂至全缘,常无毛,具短柄或无柄。总状花序有数花至多花,在果期疏生;花极小,白色;花梗短,丝状,果期增长,略伸展;萼片微小,近伸展,长圆形,具白色边缘,基部不成囊状;花瓣倒卵形,和萼片近等长,基部楔形;侧蜜腺成对,极微小,点状,无中蜜腺;子房2室,有多数胚珠,柱头短,头状。短角果椭圆形,压扁,无毛,开裂,无翅,果瓣有1显明中脉,隔膜窄椭圆形,膜质,无脉。种子数个,微小,浅棕色;子叶背倚胚根。

3或4种,分布于欧亚大陆、地中海地区、中亚、澳大利亚、北美及智利。我国有1种。