

单毛及分叉毛。茎生叶纸质,倒卵形或倒披针形,长10—15毫米,宽2—4毫米,顶端圆钝,基部渐狭,全缘或边缘每侧有1齿,茎下部叶无毛,上部叶有单毛及分叉毛;叶柄长1—2毫米。萼片卵形,长1—1.5毫米,绿白色或紫色,外面有白色硬毛;花瓣白色,宽倒卵形,长约5毫米,顶端凹缺,有短爪;花药紫色。短角果宽菱形,长1—2毫米,压扁,裂瓣膜质,盖状,隆起,有毛或近无毛,具圆锥状粗喙;果梗开展或反折,长3—5毫米。种子1个,卵形,长约1毫米。 花果期6—8月。

产四川、云南。生在高山流石滩间。模式标本采自云南丽江。

变种检索表

1. 茎及叶被单毛及分叉毛。

2. 短角果被毛或近无毛……………1a. 蛇头荠(原变种) var. *iberideum*

2. 短角果密被开展刚毛……………1c. 刚毛蛇头荠 var. *dasycarpum* O. E. Schulz

1. 茎及叶密被叉状毛,毛长约1毫米……………1b. 叉毛蛇头荠 var. *iberideum* f. *pilosius* O. E. Schulz

1b. 叉毛蛇头荠(变种)

Dipoma iberideum var. *iberideum* f. *pilosius* O. E. Schulz l. c. 9:474. 1926.

茎及叶密生叉状毛,长约1毫米。

产四川木里。

1c. 刚毛蛇头荠(变种)

Dipoma iberideum var. *dasycarpum* O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin

11: 225. 1931; T. Y. Cheo l. c. 116.

短角果密生开展刚毛。

产四川木里。

2. 西藏蛇头荠

Dipoma tibeticum O. E. Schulz in Fedde, Repert. Sp. Nov. 38: 32. 1955.

小草本,花期高4—6厘米,密生长约1毫米的柔毛。茎下部叶卵形,长约6毫米,宽约4毫米,顶端圆形,基部收缩成长叶柄,边缘两侧各有1齿;上部叶几全部成苞片状,较小,长圆状倒卵形,边缘每侧各有1齿或全缘,有短叶柄。总状花序伞房状,具苞片;花梗长5—8毫米;萼片倒卵形,长约2.5毫米,密生柔毛;花瓣白色,倒卵形,长约4.5毫米,顶端弯缺状凹陷,具少数带黄色脉,基部成短爪;花药黄色;子房有6胚珠,具短柔毛,有短花柱及稍凹陷柱头。成熟短角果未见。

产甘肃、西藏。生在山坡石堆间,海拔3900—5500米。模式标本采自西藏错那。

未见标本,描写从有关文献节译。