

25. 双脊荠属*——*Dilophia* Thoms.

Thoms. in Hook. f., Kew Journ. 4(5): 19. 1853; Benth. et Hook. f.

Gen. Pl. 1: 89. 1862; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzen-

fam. 2. Aufl. 17b: 460. 1936.

一年或多年生草本;茎多数,直立或近直立,多从基部分枝,无毛或具单毛。叶肉质,匙形或线形,全缘或具数齿,渐狭成叶柄;基生叶成莲座状,茎生叶常在花序成苞片状。总状花序密集,花多数,近头状或伞房状;花梗短,果期稍增粗;萼片卵形,开展,常宿存,有膜质边缘,基部不成囊状;花瓣白色,匙形,比萼片长,顶端截平或微凹,具少数脉;侧蜜腺成对,半月形,具等长弯曲的附属物,从基部伸出,无中蜜腺;子房有4—10胚珠,柱头截平或近2裂,无花柱。短角果近倒心形,扁压,2室,开裂,果瓣背部浅囊状,常有2脊,无毛,隔膜常不完全。种子小,成2行,长圆形,棕色;子叶背倚胚根。

约5种,分布在中亚及喜马拉雅地区。我国有3种。

本属模式种: 盐泽双脊荠 *Dilophia salsa* Thoms.

分 种 检 索 表

- 1. 茎生叶宽卵形或长圆形……………1. 双脊荠 *D. fontana* Maxim.
- 1. 茎生叶线形、线状匙形或线状长圆形。
 - 2. 叶线形或线状长圆形,在花序下的成苞片状……………2. 盐泽双脊荠 *D. salsa* Thoms.
 - 2. 叶线状匙形;花无苞片……………3. 无苞双脊荠 *D. ebracteata* Maxim.

1. 双脊荠 图版 19:1—3

Dilophia fontana Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 26: 423. 1880. et Fl. Tangut. 70. t. 13. f. 1—18. 1889; O. E. Schulz in Acta Hort. Gothob. 1:166. 1924; Rehd. et Kobus. in Journ. Arn. Arb. 14: 16. 1933; Walker in Contrib. Unit. Stat. Nat. Herb. 28:622. 1941.——*D. macrosperma* O. E. Schulz in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 385. 1922. Syn. nov.

多年生草本,高3—6厘米;根肉质,纺锤形。茎多数,丛生,基部匍匐,后上升,分枝,有单毛。基生叶在花期枯萎,茎生叶宽卵形或长圆形,长6—10毫米,宽2—5毫米,顶端圆形,基部圆形或楔形,全缘或每侧有1齿,两面无毛;叶柄长5—15毫米,无毛;上部茎生叶较小,有短叶柄。总状花序在茎端密生,下部花单生叶腋,常有叶状苞片;萼片宽卵形,

* 属的异名: 双脊草属(中国种子植物科属辞典)。