

房状,顶生或腋生,果期伸长;花梗长1—2毫米;花瓣黄色,长约2.5毫米。果梗长3—5毫米,下垂,末端翘起;果瓣上具窄翅,翅向上折转,使果实成上凹下凸,连同顶端三角形,成一舟状;果瓣密被毛。种子卵圆状椭圆形,长约3毫米,宽约2毫米。花期4—5月。

产新疆、西藏西部。多生于荒漠草原,少数生于砾石戈壁、路边、田边、河岸。蒙古、苏联的中亚,以及克什米尔地区均有分布。模式标本采自中亚。

1b. 光果舟果芥(变种)

Tauscheria lasiocarpa Fisch ex DC. var. **gymnocarpa** (Fisch. ex DC.) Boiss. Fl. Orien. 1: 372. 1867; A. H. Vass. in Фл. Казакст. 4: 235. 1961. — *T. gymnocarpa* Fisch. ex DC., Syst. Nat. 2: 563. 1821.

果瓣光滑无毛。

分布、生境与原变种同。

33. 乌头芥属——**Euclidium** R. Br.

R. Br. in W. et W. T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 74. 1812; O.

E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. 17b:475.

1936, nom. cons. — *Hierochontis* Medik. Pflanzen. Gatt. 51, 1792 —

Soria Adanson, Fam. 2: 421 Aug. 1763.

一年生草本,被2叉毛。萼片分离,基部不呈囊状;花瓣淡黄色或白色;雄蕊分离,花丝无齿,侧蜜腺三角形,小,位于短雄蕊两侧,中蜜腺无;子房无柄,花柱圆锥形,向外弯曲。短角果小,卵形,呈坚果状,2室,果皮与隔膜均本质化;果梗粗短,几乎与茎相贴。种子每室1粒;子叶扁平,缘倚胚根。

仅1种,分布在欧亚大陆;我国新疆产。

本属模式种: 乌头芥 *Euclidium Syriacum* (L.) R. Br. (*Anastatica syriacum* L.)

1. 乌头芥(中国高等植物图鉴) 图版 27: 1—4

Euclidium syriacum (L.) R. Br. in Act. Hort. Kew. ed. 2, 4: 74. 1812; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 164. 1872; N. Busch, Fl. Sib. et Orient. Extr. 6: 599. 1931; Vass. in Kom. Fl. URSS 8: 323. 1939; 中国高等植物图鉴 2: 45. 图 1820. 1972; Jafri, Fl. West Pakist. 55: 103. fig. E-F. 1973 — *Anastatica syriacum* L. Sp. Pl. 895. 1753.

一年生草本,高10—20(—25)厘米,被2叉毛,偶有3叉毛,少数在茎基部仅有单毛或以单毛为主。枝铺散,常于节处稍曲折。叶长圆状椭圆形,长1.5—4(—6)厘米,宽0.5—2厘米,顶端钝圆,少数具小尖头,基部楔形,边缘具波状齿、微齿或全缘;下部叶具柄,向上渐短至无柄。花序顶生,果期伸长;花白色或黄色,很少。短角果椭圆状卵形,长