

cons. — *Rapistrum* A. Haller, Hist. Stirp. Helv. 1: 224. 1768, nom
Crantz 1769.

一年生草本，被2叉或3叉毛。基生叶有柄，茎生叶无柄，叶基部箭头形。萼片直立，基部不呈囊状；花瓣黄色，具爪；雄蕊分离，花丝无齿；侧蜜腺不汇合，新月形，位于短雄蕊两侧，中蜜腺三角形，位于长雄蕊外侧；子房无柄，花柱长，子房以隔膜完整与否而成1室或2室。短角果呈小坚果状，不开裂，表面因具网状脉纹而成蜂窝状。种子1粒，偶为2粒；子叶扁平，背倚胚根。

2种，我国有1种。

本属模式种：球果芥 *Neslia paniculata* (L.) Desv. (*Myagrism paniculata* L.)

1. 球果芥(东北植物检索表) 图版 27:10—12

***Neslia paniculata* (L.) Desv.** in Journ. de Bot. 3: 162. 1814; N. Busch, Fl. Sib. et Orient. Extr. 3: 289, 291. 1939; Vass. in Kom. Fl. URSS 8: 602. 1939; 东北植物检索表 114. 图版 30, 图 6. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 46. 图 1821. 1972; Jafri, Fl. West Pakist. 55: 105. tab. 11, G-H. 1973; 东北草本植物志 4: 83. 图版 46. 1980 — *Myagrism paniculatum* L., Sp. Pl. 641. 1753.

一年生草本，高20—85厘米，有稍硬的毛而粗糙，毛2—3分叉。基生叶早枯，叶片长圆形，长5—7(—12)厘米，宽1—2(—2.5)厘米，顶端急尖，基部渐窄成柄，柄长1—2厘米，全缘或具疏齿；茎生叶无柄，叶片长圆状披针形，由下向上渐小，长2—8(—12)厘米，宽2—18(—22)毫米，顶端渐尖，基部箭形，具耳，抱茎，全缘或具疏齿。花序伞房状；萼片长圆卵形，长约1.8毫米，宽0.75—1毫米；花瓣倒卵形，长2—2.5毫米，宽约0.8毫米，顶端钝圆，具爪。短角果球形，宽大于长，宽2—2.5毫米，长1.75—2.25毫米，不开裂，具网状脉纹而呈蜂窝状，顶端钝，长约1毫米，喙基部略为收缩。种子1粒，卵形，红褐色。花期5—6月。

产东北各省、内蒙古、新疆、西藏。生于田野、山坡草丛。西伯利亚、克什米尔地区、欧洲及加拿大均有分布。模式标本采自欧洲。

36. 匙芥属* — *Bunias* L.

L., Sp. Pl. 669. 1753; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. 17b: 479. 1936.

一年生草本，被单毛与分枝毛。叶羽状深裂或大头羽状深裂。萼片直立，基部略成囊状；花瓣白色或黄色，雄蕊分离，花丝无翅或齿；侧蜜腺环状，外侧三浅裂，围绕短雄蕊，中

* 属的异名：班倪属(中国种子植物科属辞典)



1—4. 乌头芥 *Euclidium syriacum* (L.) R. Br.: 1. 植株, 2. 花, 3. 短角果背面观, 4. 短角果侧面观。 5—9. 舟果芥 *Tauscheria lasiocarpa* Fisch ex DC. var. *lasiocarpa*: 5. 植株, 6. 花, 7. 短角果上表皮毛, 8. 短角果背面观, 9. 短角果腹面观。 10—12. 球果芥 *Neslia paniculata* (L.) Desv.: 10. 植株, 11. 花, 12. 短角果。(史渭清绘)