

成侧生附片状,短雄蕊花丝具附片;子房被星状毛。短角果宽椭圆形或近圆状倒卵形;果梗长5—10毫米,近水平展开。种子每室2粒,卵形,长1.5—2毫米,扁平,有边或无边。花期5—6月。

产黑龙江、内蒙古。生长在草原、山坡、沙丘或砾石地。蒙古、苏联(西伯利亚、远东)均有分布。模式标本采自西伯利亚。

与本种近似的还有球果庭荠 *A. fedtschenkoanum* N. Busch, 据文献记载我国有分布。二者区别是球果庭荠短角果小,直径约2毫米;而本种则短角果大,椭圆形或近倒卵形,直径2.5—5毫米。

8. 球果庭荠

Alyssum fedtschenkoanum N. Busch in Not. Syst. Herb. Bot. Pétrop. **4**(19—20):145. pl. 1923; N. Busch in Kom. Fl. URSS **8**: 347. 1939; T. R. Dudley in Journ. Arn. Arb. **45**: 368. 1964.

多年生草本,呈半灌木状,不育枝高1.5—10厘米,能育枝高约25厘米,密被星状毛而呈灰白色。茎基部木质化,自基部分枝。叶宽椭圆形或倒卵形,长3—8厘米,宽2—3毫米,顶端钝尖,基部楔形渐窄。花序伞房状,花后伸长;萼片卵形,长1.5—2.7毫米,宽1—1.2毫米,具爪。短角果球形,直径约2毫米,花柱与角果等长;果梗长3—4毫米。种子椭圆形,长约1.5毫米,淡褐色,无边。花期5—6月。

文献载我国西部有分布,但未见标本,附志于此,留待核实。苏联的西伯利亚和中亚都有分布。模式标本采自中亚。

9. 扭庭荠

Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. Sp. Pl. **3**: 466. 1800; N. Busch in Kom. Fl. URSS **8**: 344. 1939; T. R. Dudley in Journ. Arn. Arb. **45**: 369. 1964.——*Odonarrhena obovata* C. A. Mey. in Lédeb. Fl. Alt. **3**: 64. 1831.

多年生草本,高8—30厘米,密被星状毛。茎外倾而弯曲,基部木质化。叶长圆状倒卵形或长圆状披针形,基部渐窄。花序分枝或伞房状圆锥花序;萼片长约2毫米;花瓣金黄色,长2.5—3(—4)毫米。短角果椭圆形或倒卵状长圆形,长2.5—4.5毫米,偶长5—6毫米,密被星状毛;果梗长0.4—0.6毫米,斜向上展开。种子每室1粒,长1.2—1.5毫米,宽0.6—1.2毫米,无边,红棕色。花期4—6月。

文献载新疆有分布,但未见标本,仅附于此,留待核实。苏联的西伯利亚、欧洲均有分布。模式标本采自欧洲。

10. 哈密庭荠 图版 29: 5—9

Alyssum magicum Z. X. An, 东北林学院植物研究 **1**(1—2): 98. 1981.

多年生草本,高30—35厘米,被星状毛,叶上毛比茎上毛密。茎直立,自基部分枝。叶长圆状倒卵形,全缘,顶端急尖或钝,茎下部叶有柄,连柄长8—10厘米,上部叶无柄,长