

变种检索表

1. 茎具叶少, 3 枚左右; 叶窄; 植株高 6—35 厘米, 总状花序有花 10—65 朵
20a. 云南葶苈(原变种) var. *yunnanensis*

1. 茎具叶多, 3 枚以上; 叶较宽。

2. 果梗粗, 叶宽 20b. 宽叶云南葶苈 var. *latifolia* O. E. Schulz

2. 果梗丝状, 角果常扭转 20c. 细梗云南葶苈 var. *gracilipes* Franch.

20b. 宽叶云南葶苈(变种)

Draba yunnanensis Franch var. ***latifolia*** O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4. 105): 182. 1927.

基生叶倒卵形; 茎生叶椭圆形或宽长圆形。 花期 6—7 月。

产四川南部、云南丽江雪山。生于山坡石隙中, 海拔 5500—5650 米。模式标本采自云南。

20c. 细梗云南葶苈(变种)

Draba yunnanensis Franch var. ***gracilipes*** Franch. l. c. 402. 1886; O. E. Schulz, l. c. 182. 1927.

果梗丝状, 短角果常扭转。 花期 5 月中旬。

产云南丽江雪山。生于岩石缝中、石隙边, 海拔 2780—2950 米。模式标本采自云南。

21. 灰岩葶苈 图版 35: 4—6

Draba calcicola O. E. Schulz in Anzeiger Akad. Wien n. **12**: 2. 1926; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4. 105): 183. 1927—*D. aprica* O. E. Schulz, l. c. 373. 1927.

多年生草本, 高约 20 厘米。茎直立, 被单毛、叉状毛和分枝毛, 毛灰白色。基生叶莲座状丛生, 长椭圆形或倒卵状楔形, 顶端钝, 基部缩窄, 近于无柄, 全缘; 茎生叶长椭圆形或长卵形, 全缘或每边有细齿, 基部扩大, 抱茎; 叶都被单毛、星状毛和分枝毛。总状花序有花 8—35 朵, 下面数花有苞片; 小花梗长 2—8 毫米; 萼片长 3—4 毫米; 花瓣黄色, 倒卵楔形, 长 5—6 毫米, 顶端微凹; 雄蕊花丝扩大; 雌蕊窄瓶状。短角果长椭圆形或长卵形, 有单毛、叉状毛, 有时无毛; 花柱长 1.5—1.8 毫米。 花果期 8 月。

产云南中甸哈巴雪山。生于峭壁, 海拔 3400 米。模式标本采自云南中甸。

22. 宝兴葶苈

Draba moupinensis Franch. in Nouv. Arch. Mus. Peris 2. ser. **8**: 200. 1886 et Pl. David. **1**: 18. 1888; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89** (4. 105): 183. 1927.

多年生草本, 高 12—36 厘米; 根茎短。茎直立, 不分枝或分枝, 被单毛、叉状毛和分枝