

植株较壮,高6—12厘米。主根纺锤形。分枝茎长约5厘米,粗约3毫米,坚实,不下垂,呈半丛生状。茎具叶5—9枚,被小星状毛,上部无毛或有少量单毛。基生叶卵形,先端钝,全缘或有少许锯齿,被小星状毛;茎生叶椭圆形或卵形,长5—8毫米。总状花序着花稀疏,结实时伸长,小花梗长4—5毫米;萼片宽卵形,长约2.5毫米;花瓣灰黄色,长5—5.5毫米,先端凹缺,两侧不等;外轮雄蕊有时无花药,内轮的花丝全部或成对的自上而下联合,花药往往多少不发育。短角果卵圆形,长4—5毫米;花柱长约0.5毫米。种子不完全发育。

产云南中甸、德钦、太子雪山。生于高山草地,海拔3500—4650米。模式标本采自云南中甸。

本种为杂交种,未列入检索表。

26. 阿尔泰葶苈

Draba altaica (C. A. Mey.) Bunge in Delect. Sem. Hort. Dorpat. 8.1841; Lédeb. Fl. Ross. **1**: 754. 1842; N. Busch. Fl. Sib. et Or. Extr. **3**: 326. 1919. fig. p. 328; Pohle in Fedde, Repert. Beih. **32**: 100. 1925; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89** (4. 105): 216. 1927; A. Tolmatshev in Kom. Fl. URSS **8**: 432. 1939. — *D. rupestris* R. Br. *β. altaica* C. A. Mey. in Lédeb. Fl. Alt. **3**: 71. 1831. — *D. rupestris* Bunge Suppl. in Lédeb. Fl. Alt. **1**: 70. n220. 1836. — *Braya glacialis* Korsh. ap. Fedtsch. in Act. Hort. Pétrap. **23**. **2**: 419. 1904.

26a. 阿尔泰葶苈(原变种)

Draba altaica (C. A. May.) Bunge var. ***altaica***

多年生丛生草本,高2—7厘米,有时可达15厘米。根茎分枝多,密集,基部密具干膜质纤维状枯叶,有光泽;上部簇生莲座状叶。花茎单一或有1侧枝,直立,大多具1—2叶,很少无叶,被长单毛、有柄叉状毛及星状分枝毛。基生叶披针形或长圆形,长6—20毫米,宽1—2毫米,顶端渐尖,全缘或两缘有1—2锯齿,基部渐窄,两面被长而硬的单毛、叉状毛为主,混生星状毛与分枝毛。茎生叶无柄,披针形,全缘或有1—2锯齿。总状花序有花8—15朵,密集成头状,下面1—2朵花有时有叶状苞片;萼片长椭圆形,长约1—2毫米;花瓣白色,长倒卵状楔形,顶端微凹,长2—2.5毫米。短角果聚生近于伞房状,椭圆形或长椭圆形或卵形,长3—6毫米,宽1.5—2毫米,无毛,罕有短单毛或二叉毛;果瓣扁平,或有槽纹。种子褐色。花期6—7月。

产甘肃、青海、新疆、西藏。生于山坡岩石边、山顶碎石上、阴坡草甸、山坡砂砾地,海拔2000—5300米。苏联西伯利亚、土耳其斯坦,以及克什米尔地区均有分布。模式标本采自苏联。