

Turkest. in Beih. Bot. Zentralbl. 19. 2. Abt., Heft. 2: 309. 1906; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 89(4. 105): 218. 1927. — *D. rupestris* R. Br. var. *pusilla* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 15. 1: 150. 1842.

植株矮小,花萼高仅 2—3 厘米。基生叶全缘或近于全缘。

产新疆吐鲁番县博格达山、西藏。生于高山沼泽、流石坡,海拔 3300—5300 米。苏联土耳其斯坦,以及克什米尔地区等地也有分布。模式标本采自苏联。

27. 球果葶苈

Draba glomerata Royle, Illustr. Bot. Himal. 1: 71. 1839; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 89(4. 105): 220. 1927.

27a. 球果葶苈(原变种)

Draba glomerata Royle var. ***glomerata***

多年生草本,高 1—9 厘米。茎被单毛、叉状毛和近于星状的分枝毛,毛灰白色。基生叶椭圆形或长卵形,长 0.6—1.8 厘米,宽 2—3 毫米,顶端渐尖或钝,基部缩窄,全缘或有 1—2 小锯齿;茎生叶长卵形,无柄,全缘或有锯齿,两侧不等。叶都密被单毛、叉状毛、星状毛或分枝毛。总状花序有花 7—15 朵,密集成圆头状,常有 1—4 叶状苞片及总苞;萼片椭圆形,背面密被单毛和叉状毛;花瓣白色。短角果长椭圆形,长 3—6 毫米,宽 1.5—2 毫米,无毛,呈头状聚生。花期 6 月末—7 月。

产青海、新疆、四川、西藏。生于山坡草地、河边砂土地、高山沼泽地及砾石质草甸,海拔 2900—5500 米。克什米尔地区、尼泊尔西部、帕米尔东部也有分布。模式标本采自喜马拉雅山区。

27b. 粗球果葶苈(变种)

Draba glomerata Royle var. ***dasycarpa*** O. E. Schulz l.c. 220. 1927.

植株粗壮,全体被长单毛和叉状毛。短角果粗,有单毛和叉状毛。

产甘肃、四川、西藏。生于山坡砂砾地或碎石质缓坡,海拔 4040—5340 米。喜马拉雅山有分布。模式标本采自喜马拉雅地区。

28. 福地葶苈 图版 38: 6—8

Draba fladnizensis Wulfen in Jacq. Miscell. Austr. 1: 147. 1778; Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 15: 251. 1842 et in Fl. Baical.-Dahur. 1: 133. 1842; N. Busch, Fl. Sib. et orient. Extr. 3: 333. fig. in p. 334. 1919; Pohle in Fedde, Repert. Beih. 32: 80. 1925; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 89(4. 105): 253. 1927; A. Tolmatshev in Kom. Fl. URSS 8: 403. 1939 — *D. alpina* Clairv, Man 217. 1811.

多年生丛生草本。主根细长,根茎多分枝,短,基部宿存覆瓦状鳞片枯叶,上部簇生莲座状叶。花茎单一,很少分枝,直立或略弯,高 2—6 厘米,无叶或偶有 1—2 叶,疏生单毛或无毛。基生叶倒卵状披针形,长 0.5—1 厘米,顶端渐尖或钝,全缘或偶有 1—2 小齿,基