

5 厘米,宽 1.5—2 厘米。

分布于陕西、青海、新疆、四川;生于山坡或林间草地;海拔 1700—4200 米。模式标本采自四川康定。

45c. 短茎葶苈(变型)

Draba nemorosa L. f. **acaulis** S. Sommier in Nuov. Giorn. Bot. Ital. **25**: 52. 1893; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4. 105): 313. 1927.

一般茎不发育。总状花序从基部抽出,成丛生状。

产甘肃、青海、四川、西藏;生于山坡草丛、高山草甸,海拔 1400—4750 米。苏联西伯利亚有分布。模式标本采自西伯利亚。

45d. 光果葶苈(东北植物检索表)(变种)

Draba nemorosa L. var. **leiocarpa** Lindbl. in Linnæa **8**: 33. 1839; Lédeb. Fl. Ross. **1**: 154. 1842; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4. 105): 314. 1927.

短角果无毛。

产东北、内蒙古等地。欧洲北部有分布。生于山坡草丛。模式标本采自欧洲北部。

46. 天山葶苈

Draba melanopus Komar. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. Bot. **26**: 102. 1896; Pohle in Fedde, Repert. Beih. **32**: 21. 1925; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4. 105): 317. 1927; A. Tolmashev in Kom. Fl. URSS. **8**: 453. 1939.

多年生或二年生草本。根茎短,基部宿存膜质鳞片,上部簇生莲座状叶。茎细,直立,单一或从同一莲座丛上长出 2—3 株,高 1.5—10(20)厘米,无叶或有 1—2 叶,被单毛、星状毛和少量分枝毛,毛直达小花梗。莲座状基生叶窄披针形,长 20—26 毫米,宽 3—4 毫米,顶端渐尖,基部缩窄成柄,被星状毛、单毛和叉状毛;茎生叶披针形,无柄,基部略抱茎,被有与基生叶相同的毛。总状花序有花 5—12 朵,疏松,结实时伸长;萼片椭圆形,长 1.2—1.5 毫米,背面有单毛和分叉毛;花瓣黄色,窄匙形,长 2—2.3 毫米,先端凹,边缘直截形;雄蕊长约 1.2 毫米,花药小,卵圆形,雌蕊长卵形。短角果长卵状椭圆形,长 7—9 毫米,宽 2—3 毫米,和小果梗几乎等长,无毛,花柱不发育。果梗与花序轴成直角或斜向上开展。

产新疆天山后峡。生于阴湿岩石边,海拔 2150 米。中亚也有分布。模式标本采自苏联。

所见标本,茎有 2 叶,而文献描述为无叶,稀有 1 叶。

47. 狭果葶苈(中国高等植物图鉴)

Draba stenocarpa Hook. f. et Thoms. in Journ. Proceed. Linn. Soc. Bot. **5**: 153. 1861; Pohle in Fedde, Repert. Beih. **32**: 11. 1925; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4. 105): 318. 1927; A. Tolmashev in Kom. Fl. URSS **8**: 450. 1939.——*D. linearis*