

产云南禄劝县及西北部。生于草地潮湿处,海拔3800—4100米。普遍生长。我国西藏与缅甸交界处也有分布。模式标本采自云南。

本种与纤细葶苈 *D. gracillima* Hook. f. et Thoms. 相近,其区别在于多年生,叶柄有时较长,毛为单毛和叉状毛。

51. 椭圆果葶苈 图版41: 4—6

Draba ellipsoidea Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. **5**: 153. 1861; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4. 105): 329. 1927.

一年生草本,矮小,高1.5—8厘米,主根细。茎从基部分枝,被星状毛,叶膜质,基部的叶狭匙形或窄倒卵形,长0.5—2厘米,宽2—4厘米,顶端钝或渐尖,基部逐渐缩窄成柄,全缘或每缘有1—3锯齿;茎生叶少,被叉状毛及星状毛。总状花序有花3—12朵,疏松,花梗长3—5毫米;花未见,根据文献记载:花小,白色。短角果椭圆形或近圆形,长3—9毫米,宽3—3.5毫米,几乎无花柱,绿色;果瓣薄,被单毛、叉状毛或少量星状毛。种子短椭圆形,深褐色。果期8—9月。

产甘肃、青海、四川、云南西北部及西藏。生于山坡草地阴处、河岸坡地草丛下,岩石旁,海拔3900—5000米。锡金也有分布。模式标本采自锡金。

52. 台湾葶苈台湾山芥(台湾植物志)

Draba sekiyana Ohwi in Fedde, Repert. Sp. Nov. **36**: 51. 1934; Masamune, List Pl. Taiwan **56**. 1954; Liu et Ying in Hui-lin Li, Fl. Taiwan **2**: 451. 1976.

一年生丛生草本,被星状疏柔毛。基生叶莲座状丛生,革质,披针形或倒披针形,长5—7毫米,顶端钝,基部楔形,全缘,两面都被毛;茎生叶无,或仅有1—2叶,与基生叶相似。总状花序上的花小,小花梗细长,长约3.5毫米,有毛;萼片椭圆形,顶端圆,长约1毫米;花瓣倒卵形至匙形,白色,长约3.5毫米;子房纺锤形,压扁,无毛,柱头微2裂。短角果长椭圆形,压扁。

产台湾。生于中部山地较高海拔处。未见标本,据文献记载,附录于此,留待核实。

53. 山葶苈(东北植物检索表)

Draba multiceps Kitag. in Report First Sci. Exped. Manch. Sect. 4 Part **2**: 18. f. 6. 1933.

多年生丛生草本。根圆锥形,粗长,发出稀疏的细分枝根。根茎木质化,分枝多,下部宿存卵形或三角形的覆瓦状鳞片,有光泽。茎单一,直立,高常达6厘米(果枝),被灰白色星状毛。基生叶密集成莲座状,窄条形,长达21毫米,宽约2毫米,顶端渐尖,基部稍扩大,多少有光泽,全缘,两面密生灰白色星状毛,中脉明显;茎生叶少,与基生叶相同,稍短。总状花序顶生。短角果条形,长7—17毫米,宽0.6—1.5毫米,花柱长约1毫米,柱头头状,果瓣平,密生单毛和星状毛;果梗长3—5毫米,直立开展,被灰白色星状毛。

产内蒙古昭乌达盟赤峰。未见标本,据文献记载,附录于此,留待核实。