

植株高约 15 厘米,近于无毛。茎单一,着生少数羽状复叶,小叶 2—3 对,基生叶及茎下部羽状复叶的顶生和侧生小叶近于圆形或卵形,浅裂或近于全缘;茎上部复叶的顶生小叶菱状卵形,3 浅裂,侧生小叶为倒卵形,通常有 1 浅齿。

产我国台湾(模式标本采地)。生于潮湿地。

27. 圆齿碎米荠

Cardamine scutata Thunb. in Trans. Linn. Soc. **2**: 339. 1794; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **18**: 281. 1872; Baihni in Candollea **7**: 281. 1937; 东北植物检索表 108. 1959; Ohwi in Fl. Jap. (in English) 482. 1965. — *Cardamine regeliana* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bot. **2**: 73. 1865. — *C. flexuosa* With. subsp. *regeliana* (Miq.) Fr. et Sav. var. *scutata* (Thunb.) O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. **32**: 477. 1903.

27a. 圆齿碎米荠(原变种)

Cardamine scutata Thunb. var. *scutata*

一年或二年生草本,高 15—30 厘米,具短而密的纤维状根。茎单一,直立或稍曲折,分枝,表面有沟棱,具疏柔毛或无毛,基部簇生多数羽状复叶成铺散状。基生叶和小叶均有明显的柄;小叶 3—4 对,顶生小叶肾圆形,长 16—13 毫米,宽 7—17 毫米,边缘有深浅不等的波状圆齿,侧生小叶与顶生小叶同形但较小,边缘有少数圆齿;茎生叶较小,小叶 1—3 对;全部小叶两面疏生柔毛,并有少数缘毛,有时无毛。总状花序顶生,花多数;外轮萼片长圆形,内轮萼片卵形,基部带囊状,长 1.5—1.8 毫米;花瓣白色,倒卵状楔形,长 3.5—4 毫米;花丝细长,稍扩大;雌蕊柱状,长约 5 毫米,花柱极短,柱头扁压。长角果线形,扁平,长 17—20 毫米,宽约 1 毫米;果梗直立开展,长 6—9 毫米。种子细小,椭圆形,长约 1 毫米,淡褐色。花、果期 4—5 月和 9—11 月。

产安徽、江苏、浙江、广东、贵州等省。生于山沟、山坡、路旁湿地。日本、朝鲜、苏联也有分布。模式标本采自日本。

本种在形态上和广布在我国各地的碎米荠 *C. hirsuta* L. 和弯曲碎米荠 *C. flexuosa* With. 十分相近,所不同的是本种的植株较柔弱,分枝较少,基生叶丛出,全部小叶较薄而钝圆,均有显著的小叶柄。

27b. 大顶叶碎米荠(东北草本植物志)(变种)

Cardamine scutata Thunb. var. *longiloba* P. Y. Fu, 东北草本植物志 **4**: 109. 图版 61. 1980。

本变种与原种的区别在于顶生小叶多为菱状卵形,通常为不规则的 3 裂,中央裂片较大,呈三角形或长圆形。

产吉林安图县(长白山)。生于海拔约 1700 米的湿地上。模式标本采自长白山。

28. 弯曲碎米荠(江苏南部种子植物手册) 碎米荠(东北植物检索表)、葶菜(台湾植物志)