

2—3 种, 产于喜马拉雅地区; 我国西藏有 1 种。

本属模式种: 藏芥 *Phaeonychium parryoides* (Kurz ex Hook. f. et T. Anders.) O. E. Schulz (*Cheiranthus parryoides* Kurz ex Hook. f. et T. Anders.)

1. 藏芥 图版 64:1—7

Phaeonychium parryoides (Kurz ex Hook. f. et T. Anders.) O. E. Schulz in Notizbl. l. c. 1092 et in Nat. Pflanzenfam. l. c. 535. — *Cheiranthus parryoides* Kurz ex Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 132. 1872.

花葶植株直立或近于直立, 高 10—30 厘米, 密被灰白色柔毛或有微小分枝毛及星状毛。基生叶莲座状, 倒披针形至匙状长圆形, 长 4—10 厘米, 宽 0.5—1.5 厘米, 通常全缘, 带肉质, 上面灰绿色, 下面灰白色, 有少数平行脉, 两面被柔毛, 有叶柄。花葶有少数花, 密集于顶端, 果期延伸长达 20 厘米; 萼片近于直立, 椭圆形, 长 3—4 毫米, 边缘有狭膜质, 背面有毛宿存; 花瓣白色或淡红色, 基部及背面带紫色, 倒卵形, 长 7—8 毫米, 宽 3—3.5 毫米; 短雄蕊长 3—4 毫米, 长雄蕊长 4—5 毫米; 子房条形而扁, 密被星状毛; 花柱短, 柱头头状。长角果条形而扁, 长 1.5—2 厘米, 宽约 2 毫米, 带扭曲, 密被星状毛; 果瓣有 1 明显的中脉, 花柱极短, 柱头 2 浅裂, 隔膜完全, 无脉。种子 5—7 粒, 卵形, 长约 1 毫米, 浅褐色。

产西藏吉隆。生于山坡石灰岩上, 海拔 4530—4900 米。模式标本采自吉隆。

48. 山芥属——*Barbarea* R. Br.

R. Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. 4: 109. 1812; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 537. 1936.


二年生或多年生直立草本, 植株光滑无毛或具疏毛, 茎具纵棱, 分枝。基生叶及茎下部叶大头羽状分裂, 具叶柄, 基部耳状抱茎; 茎上部叶具齿或羽状分裂, 无柄, 基部耳状抱茎。总状花序顶生, 萼片近直立, 内轮 2 枚常在顶端隆起成兜状; 花瓣黄色, 多数呈倒卵形, 具爪; 雄蕊 6, 分离, 花丝线形, 蜜腺发达, 侧蜜腺半环形, 中蜜腺圆锥形; 子房圆柱形, 花柱短, 柱头 2 裂或头状。长角果近圆柱状四棱形, 果瓣具明显中脉及网状侧脉。种子每室 1 行, 长椭圆形或椭圆形, 无膜质边缘; 子叶缘倚胚根。

本属模式种: 欧洲山芥 *Barbarea vulgaris* R. Br.

全世界约 15 种, 主产欧洲, 亚洲地区也有分布; 我国有 4 种。

分 种 检 索 表

- 1, 多年生草本, 根茎逐年向上生长; 基生叶及茎下部叶大头羽状分裂, 侧生裂片 2—5 对, 通常基部歪斜, 常交错对生 1, 台湾山芥 *B. taiwaniana* Ohwi



1—7.藏芥 *Phaeonychium parryoides* (Kurz ex Hook. f. et Anders.) D. E. Schulz: 1. 具花全植物, 2. 花, 3. 萼片, 示背面和内面, 4. 花瓣, 5. 雄蕊, 6. 果实, 7. 种子。(韦力生绘)