

Hui-lin Li, Fl. Taiwan 2: 678. 1976.

多年生草本,高 10—20 厘米。主根圆锥状。茎自基部丛生或单一,直立或有匍匐茎,具须根,下部密被单毛。基生叶倒披针形,与叶柄共长 1—4 厘米,宽约 6 毫米,顶端钝圆,边缘全缘或具疏钝齿,有时基部两侧具裂片 2—3 对,两面密被 2 叉毛及少数单毛;叶柄被单毛;茎下部的叶倒披针形,上部的狭披针形,长 2—4 厘米,宽约 7 毫米,两面被 2 叉毛,以背面较密;具短柄,不抱茎。总状花序顶生或腋生,有花 3—9 朵;萼片长椭圆形,长约 2.5 毫米,宽约 2 毫米,背面被单毛及 2 叉毛;花瓣白色,长椭圆形,长 4—5 毫米,宽约 2 毫米,基部呈爪状;子房与花柱长达 4 毫米。长角果线形,长 2—3.9 厘米,宽约 1 毫米,果瓣具中脉突出;果梗斜向上。种子约 20 粒,椭圆形,长约 1 毫米,无翅。花、果期 7—8 月。

产台湾(大屯山、新高山)。生于松林下,海拔 3200—3400 米。模式标本采自台湾大屯山。

3. 匍匐南芥 鬐草(中国植物图鉴,植物学大辞典) 图版 69:1—4

Arabis flagellosa Miq. Ann. Mus. Lugd.-Bat. 2: 72. 1865; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 3: 17. 1949; Makino, Fl. Jap. Rev. ed. 3: 511. f. 1532. 1953; Ohwi, Fl. Jap. 490. 1965.

多年生草本,全株被单毛、2—3 叉毛及星状毛,有时近无毛。茎自基部分枝,有鞭状匍匐茎;营养茎常向外倾斜,高 10—35 厘米,表面有沟棱。基生叶簇生,长椭圆形至匙形,长 3—7 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,顶端钝圆,边缘具疏齿,基部下延成有翅状的狭叶柄,不具裂片;茎生叶排列疏松,有时顶端有 3—6 片轮生,倒卵形或长椭圆形,长 7—9 毫米,顶端钝形。花序顶生,萼片长椭圆形,长约 5 毫米,上部边缘白色;花瓣长椭圆形,长 8—9 毫米,宽约 2.5 毫米,基部呈长爪。长角果线形,长 2—4 厘米,宽约 1.5 毫米,果瓣扁平或缢缩呈念珠状,中脉明显;果梗斜升,长约 1.2 厘米。种子每室 1 行,长圆形,长约 1.5 毫米,无翅,具明显凹点。花期 3 月,果期 4 月。

产安徽(歙县)、江苏(宜兴)、浙江(天目山、孝丰、天台山、杭州)。生于林下沟边、阴湿山谷石缝中,海拔 100—200 米。日本有分布。模式标本采自日本。

全草药用,清热解毒。

4. 圆叶南芥 图版 69:5—9

Arabis halleri L. Sp. Pl. 2: 929. 1763; Lédéb. Fl. Ross. 1: 121. 1831; Makino, Fl. Jap. Rev. ed. 3: 511, f. 1533. 1953. — *Arabis coronata* Nakai in Tokyo Bot. Mag. 28:302. 1914. syn. nov.; 东北植物检索表 103. 1959; 东北草本植物志 4:121. 图版 71. 1980.

多年生草本,高 10—30 厘米,主根圆锥状,须根多数,细小。茎自基部分枝,纤细,被单毛及 2 叉毛。基生叶簇生,卵状椭圆形,长 1—2.5 厘米,宽约 6 毫米,全缘或具疏钝齿,有时两侧具小裂片 1—2 对,形较小,两面均被单毛和 2 叉毛;叶柄细长;茎生叶倒卵形、披



1—4. 匍匐南芥 *Arabis flagellosa* Miq.: 1. 植株, 2. 植株上的单毛, 2—3 叉毛及星状毛, 3. 花枝, 4. 花, 侧面观。5—9. 圆叶南芥 *Arabis halleri* L.: 5. 植株, 6. 茎, 叶上的单毛及 2 叉毛, 7. 花, 侧面观, 8. 雄蕊及雌蕊, 9. 花瓣。(史渭清绘)