

献记载)。种子每室1行,约20粒。花期7月。

产我国台湾台中。生于岩石缝中,海拔100—600米。模式标本采自台湾台中。

本种与高山南芥 *A. alpina* L. 相近,前者叶全缘或具疏齿,仅产于我国台湾;后者叶缘有锯齿,原产欧洲及喜马拉雅山西部至西伯利亚、中国北部(据文献记载)。

11. 齿叶南芥 图版 72: 4—8

Arabis serrata Franch. et Savat. in Enum. Pl. **1**: 33. 1875 et l. c. **2**: 278. 1879; Ohwi, Fl. Jap. 489. 1965.

多年生草本,高10—30厘米,全株被较少紧贴的单毛及较多的2叉毛。主根粗壮,黑褐色。茎自基部丛生,有匍匐枝。基生叶倒卵形至长椭圆形,长1—5厘米,宽5—10毫米,顶端钝圆或急尖,边缘全缘或有锯齿,有时基部两侧具3对小裂片;叶柄长1—2厘米;茎生叶长椭圆形至披针形,长2—4厘米,宽3—10毫米,基部呈耳状,抱茎。总状花序顶生或腋生,有花10余朵;萼片卵形至长椭圆形,长约4毫米,背面被单毛;花瓣白色,倒卵形,长5—7毫米,基部呈爪状;花柱与子房长约7毫米,柱头头状。长角果外展,常反卷或弯曲,长2—6厘米,宽约1毫米,中脉不明显,宿存花柱长约1毫米;未见成熟种子。花、果期5—8月。

产安徽(黄山)。生石缝中,海拔1600米。朝鲜、日本有分布。模式标本采自日本。

12. 垂果南芥(东北植物检索表) 唐芥、扁担蒿(四川)、野白菜(内蒙古)、大蒜芥(新疆)

Arabis pendula L. Sp. Pl. 665. 1753; Maxim. Prim. Fl. Amur. 44. 1859 et in Acta. Horti. Pétrap **11**: 51. 1890; O. E. Schulz in Acta. Horti. Gothob. **1**: 162. 1924; N. Busch. Fl. Sib. et Orient. Extr. **4**: 434. f. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 364. 1931; N. Busch. in Kom. Fl. URSS **8**: 181. 1939; 东北植物检索表. 103. 1959; 北京植物志上卷 339. 图 286. 1962; Ohwi, Fl. Jap. 490. 1965; 中国高等植物图鉴 **2**: 56. 图 1842. 1972; 秦岭植物志 **1**(2): 389. 图 335. 1974; Kitag. Neo-Lineam Fl. Mansh. 327. 1979; 湖北植物志 **2**: 48. 图 746. 1980; 东北草本植物志 **4**: 121. 图 70. 1980. —— *Arabis ambigua* auct. non. DC.; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. **3**: 19. 1949.

12a. 垂果南芥(原变种) 图版 73: 1—4

Arabis pendula L. var. ***pendula***

二年生草本,高30—150厘米,全株被硬单毛、杂有2—3叉毛。主根圆锥状,黄白色。茎直立,上部有分枝。茎下部的叶长椭圆形至倒卵形,长3—10厘米,宽1.5—3厘米,顶端渐尖,边缘有浅锯齿,基部渐狭而成叶柄,长达1厘米;茎上部的叶狭长椭圆形至披针形,较下部的叶略小,基部呈心形或箭形,抱茎,上面黄绿色至绿色。总状花序顶生或腋生,有花10几朵;萼片椭圆形,长2—3毫米,背面被有单毛、2—3叉毛及星状毛,花蕾期更密;花瓣白色、匙形,长3.5—4.5毫米,宽约3毫米。长角果线形,长4—10厘米,宽1—2毫



1—3. 台湾南芥 *Arabis formosana* (Masam.) L'u et Ying: 1. 植株, 2. 植株上的单毛、
2—3 叉毛、星状毛, 3. 花瓣。4—8. 齿叶南芥 *Arabis serrata* Franch. et Savat.: 4. 植株,
5. 茎、叶上的单毛、2 叉毛, 6. 花, 7. 萼片, 8. 花瓣。(韦力生绘)