

产我国台湾(根据文献记载)。模式标本采自台湾基隆。

19. 宽翅南芥 图版 76: 1—4

*Arabis latialata* Y. C. Lan et T. Y. Cheo 东北林学院植物研究室汇刊 6: 79, 图 3. 1980.

多年生草本, 高约 30 厘米, 全株以被长单毛为主, 极少 2 叉毛。茎丛生, 下部淡紫色, 上部淡白色。基生叶倒卵形, 长 3—3.5 厘米, 宽 6—10 毫米, 顶端钝尖, 边缘具疏浅齿; 叶柄长 2—3 厘米; 茎生叶多数, 叶片狭长椭圆形, 长 1—2.5 厘米, 宽 3—5 毫米, 顶端钝圆, 边缘近全缘或具疏浅齿, 基部叶耳呈箭形, 半抱茎, 侧脉不明显。未见花(标本记载花白色)。果序总状, 顶生或腋生, 长角果条形, 长 2—3 厘米, 宽约 1.5 毫米, 紧贴果序轴; 果瓣具中脉, 宿存花柱长约 0.5 毫米; 果梗直立, 长 4—15 毫米。种子每室 1 行, 近圆形, 长 1—1.2 毫米, 周围具宽翅, 表面呈显著小颗粒状突起, 淡黄色。果期 8 月。

产西藏(错那)、青海(果洛州)。生于海拔 4300 米的山坡。模式标本采自西藏错那。

本种与硬毛南芥 *A. hirsuta* (L.) Scop. 相似, 不同在于多年生草本, 茎丛生。长角果长 2—3 厘米, 宽约 1.5 毫米, 紧贴果序轴排列。种子近圆形, 周围具宽翅, 表面有明显小颗粒状突起。

20. 窄翅南芥 图版 76: 5—8

*Arabis pterosperma* Edgew. in Trans Linn. Soc. 20: 33. 1851; O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 9: 1063. 1926; Jafri, Fl. West Pakist. 55: 177. f. 23. 1973.

二年生或多年生草本, 高 20—45 厘米, 全株密被单毛及具柄的 2 叉毛。根茎略木质化, 表面具皱折, 灰褐色。茎丛生, 直立, 分枝或不分枝。基生叶长椭圆形或匙形, 长 3—5 厘米, 宽 10—15 毫米, 边缘具浅疏齿, 下部呈翅状, 有短柄; 茎生叶多数, 长椭圆形、卵形至披针形, 长 2—5 厘米, 宽 5—15 毫米, 顶端钝圆, 边缘上部全缘, 下部具浅疏齿, 基部近心形, 半抱茎。总状花序顶生或腋生, 具花 15—20 朵; 萼片卵形至椭圆形, 长约 4 毫米, 背面近无毛; 花瓣白色、带淡紫色或粉红色, 长椭圆形, 长 6—7 毫米, 爪短; 子房与花柱长约 5 毫米, 柱头头状。长角果条形, 长 4.5—5 厘米, 宽 1.5—1.8 毫米, 直立; 果瓣具中脉, 顶端宿存花柱短; 果梗直立, 长约 6 毫米。种子每室 1 行, 25—35 粒, 种子长椭圆形, 长约 1 毫米, 表面颗粒状不明显, 淡褐色, 仅末端具翅。花、果期 6—7 月。

产西藏(聂拉木、吉隆)。生于路边、山坡草地, 海拔 3800—4300 米。印度、巴基斯坦亦有分布。模式标本采自喜马拉雅山东部。

21. 抱茎南芥

*Arabis amplexicaulis* Edgew. in Trans Linn. Soc. 20: 33. 1851; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 136. 1872; O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin. 9: 1063. f. 23; T. 3. 1927; Jafri, Fl. West Pakist. 55: 177. 1973.

二年生或多年生草本, 高 40—72 厘米, 全株被单毛、2 叉毛。茎直立, 上部稍分枝, 基



1—4. 宽翅南芥 *Arabis latialata* Y. C. Lan et T. Y. Cheo: 1. 植株, 2. 茎、叶上的单毛及  
2 叉毛, 3. 果实, 4. 种子。 5—8. 窄翅南芥 *Arabis pterosperma* Edgew.: 5. 花、果株,  
6. 茎、叶上的单毛及 2 叉毛, 7. 花, 8. 种子, 示一端具宽翅。(韦力生绘)