

头状。长角果线形,长4—6.5毫米,宽0.5—1毫米,紧密排列,直立,果瓣具细中脉;果梗直立,长7—17毫米。种子长椭圆形,长1.25—2毫米,边缘具窄翅,表面光滑,褐色。果期7月。

产新疆(伊犁、绥定)。生于干燥牧场、草原、山坡林下,海拔1920—2700米。苏联、蒙古、伊朗亦有分布。模式标本采自苏联西伯利亚。

51. 腋花芥属——*Parryodes* Jafri

Jafri in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **22**: 207. 1957.

多年生草本。茎直立或开展,有单毛及2叉毛。基生叶莲座状,叶片匙形,边缘稍有齿;茎生叶近匙形或匙形,全缘。总状花序疏松,腋生;苞片近匙形或长圆楔形,全缘;有花梗;萼片长圆状卵形,内轮基部囊状;花瓣大,紫色,近匙形或倒卵状楔形。长角果线形,无毛,具中脉,宿存柱头头状,稍2裂。种子小。

仅1种,产我国西藏;不丹也有分布。

本属外形与条果芥属 *Parrya* R. Br. 相似,但萼片开展,具茎生叶,花生于苞片腋部,柱头头状,稍2裂,易于区别。

本属模式种: 腋花芥 *Parryodes axilliflora* Jafri

1. 腋花芥

Parryodes axilliflora Jafri l. c. **22**: 207. 1957. — *Arabis axilliflora* (Jafri) Hara in Journ. Jap. Bot. **47**(4): 107. 1972.

多年生草本,高10—20厘米。茎近直立或上升,基部分枝,全株有分叉毛及单毛。基生叶莲座状,匙形,长2.5—7.5厘米(包括叶柄长2—5厘米),宽6—13毫米,顶端圆形,边缘稍有齿;下部茎生叶(叶腋无花者)近匙形或匙形,长2—4厘米,宽5—15毫米,近全缘。总状花序疏松,有花5—12朵,腋生;苞片近匙形或长圆楔形,全缘或近全缘;花紫色,直径11—14毫米,均生在苞片腋部;花梗长5—7毫米;萼片浅形紫色,开展,长圆状卵形,长6—7毫米,内轮基部囊状;花瓣近匙形或倒卵状楔形,长10—14毫米。长角果(幼果)线形,长约14毫米,宽约1.3毫米,无毛,压扁,果瓣具中脉;柱头头状,近2裂;果梗长2.5毫米。种子微小,宽卵形或近圆形,长约0.6毫米。花期6月。

产西藏南部。生于山坡,海拔4200米。不丹也有分布。未见到标本,从文献节译。模式标本采自西藏南部。