

自克什米尔地区。

7. 小鼠耳芥

Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch in Fl. Cauc. Crit. **3**(4): 457. 1909 et in Kom. Fl. URSS **8**: 78. 1939; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **86**(4, 105): 192. 1924.——*Sisymbrium pumilum* Steph. in Litt. ap. Willd. Sp. Pl. **3**(1): 507. 1800.

7a. 小鼠耳芥(原变种)

Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch var. **pumila**

一年生小草本,高2—20(—50)厘米,全株被2叉、3叉与4叉毛。茎直立,自基部分枝或单一。基生叶莲座状,叶片长圆形或倒卵形,顶端钝,基部渐窄成柄;茎生叶无柄,叶片基部箭形,抱茎,边缘具波状齿、小齿或全缘,生于茎下部的叶长圆形,上部的为披针形。花序伞房状,花后伸长成总状;花梗长2—3毫米;萼片卵圆形,长约1.3毫米,顶端钝,有时在上部变成淡紫色;花瓣黄色,倒卵形,长1.7—2毫米;雄蕊花丝细,花药宽卵形,基部略叉开。长角果线形,长1.2—2.5厘米,略扁压,果瓣中脉明显,顶端钝,被星状毛;花柱长约0.5毫米,柱头头状;果梗丝状,长5—9毫米。种子每室1行,种子卵状椭圆形,长约0.75毫米。

产甘肃、新疆、云南。苏联的中亚、阿富汗、伊朗、地中海地区及欧洲东部均有分布。模式标本采自阿富汗。

7b. 赤水鼠耳芥(变种)

Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch var. **alpina** (Korsh.) O. E. Schulz in Eng. Pflanzenr. **86**(4, 105): 280. 1924.——*Sisymbrium pumilum* Steph. var. *alpinum* Korsh. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 5 Ser. **9**(5): 410. 1898.

本变种高3—30厘米;长角果短,长1—1.2厘米,宽约1.2毫米。

据文献记载,产新疆,但未见标本,附志于此,留待核实。

8. 直鼠耳芥

Arabidopsis stricta (Camb.) N. Busch in Fl. Cauc. Crit. **3**(4): 457. 1909; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **86**(4, 105): 282. 1924; Jafri, Fl. West Pakist. **55**: 275. 1973.——*Malcolmia stricta* Camb. in Jacquem. Voy. Bot. **4**: 16, tab. 16. 1844.——*Sisymbrium strictum* Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. **5**: 161. 1861; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 147. 1872.

一年生草本,高30—50(—60)厘米,被2叉毛与近星状毛,并杂有单毛、2叉毛辐射状不等长。茎多数,直立。茎下部的茎生叶匙形或窄长椭圆形,顶端钝或钝尖,边缘有疏齿或不明显的波状齿,基部楔形,渐窄成耳状;茎上部的叶窄卵圆形,无柄,边缘有小齿或无,叶均被近星状毛。花序中常有条形小苞叶,花梗长1—6毫米;萼片长圆状卵形,长约2毫米,常带紫色,外则的基部略成囊状;花瓣紫红色,长3—4毫米。长角果细,长2—4