

1955 et Fl. West Pakist. **55**: 160. 1973. — *Ermania parkeri* O. E. Schulz in Fedde, Repert. Sp. Nov. Regni. Veget. **31**: 333. 1933.

多年生草本, 高约 10 厘米, 被单毛, 很少有叉状毛。基生叶窄匙形, 长 10—15 毫米, 宽 3—5 毫米, 全缘或前端有 1—3 浅齿, 顶端钝; 茎生叶短, 叶片披针形至线形。总状花序有花 10—15 朵, 有苞叶; 萼片长约 3 毫米; 花瓣白色, 常于基部变为紫色, 长 5—8 毫米。角果线形(未成熟), 长约 10 毫米, 宽约 1 毫米, 常近基部变为紫色, 被毛; 柱头扁, 2 浅裂, 花柱无或近无, 子房每室有 8 个胚珠; 花梗长约 8 毫米。模式标本采自克什米尔地区。

据文献记载产西藏西部; 巴基斯坦、克什米尔地区也有分布。未见标本, 附录于此, 留待核实。

8. 少花高原芥

Christolea stewartii (T. Anders.) Jafri in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **22**(1): fig. 1. E. 1955 et Fl. West Pakist. **55**: 157. 1973. — *Cheiranthus stewartii* T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 132. 1872. — *Ermania stewartii* (T. Anders.) O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. **66**: 98. 1933. — *Oreoblastus stewartii* (T. Anders.) Suslova in Bot. Zhurn. CCCP **57**: 653. 1972.

多年生草本, 高 3—5(—8) 厘米, 除长角果外全株被毛。茎伸展或近伸展。基生叶莲座状, 近肉质, 叶片匙形, 长 1—3 厘米, 宽 5—10 毫米, 全缘或有 5—10 个钝圆齿, 被白色长单毛与分枝毛。总状花序有花 8—15 朵, 有苞叶, 果期可长达 6 厘米; 萼片长约 2.5 毫米; 花瓣长约 5 毫米。长角果条形, 长 25—40 毫米, 宽 2.5—3.5 毫米, 压扁, 无毛, 花柱无或近无, 柱头压扁, 2 浅裂; 果梗长约 6 毫米, 上升或偏向 1 侧。种子多数, 长约 1.5 毫米。

产西藏。克什米尔地区也有。未见标本, 附录于此, 留待核实。模式标本采自克什米尔地区。

9. 绒毛高原芥

Christolea lanuginosa (Hook. f. et Thoms.) Ovcz. in Sov. Bot. **151**: 1941; Jafri in Not Roy. Bot. Gard. Edinb. **22**: 52, fig. 1. C. 1955 et Fl. West Pakist. **55**: 156, fig. 19, H-I, 1973. — *Parrya lanuginosa* Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. **5**: 136. 1861; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 132. 1872 — *Eurycaryus lanuginosa* (Hook. f. et Anders.) Botsch. in Bot. Mat. **17**: 172. 1955. — *Ermania lanuginosa* (Hook. f. et Thoms.) O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. **17b**: 548. 1936.

多年生草本, 高约 5 厘米, 被白色单毛与叉状毛。基生叶莲座状, 长 7—13(—15) 毫米, 宽 2—6 毫米, 全缘, 顶端有 1—3 个圆齿。花萼无苞叶, 有花 8—15 朵; 萼片长约 3 毫米, 有时宿存; 花瓣淡紫色, 长 5—6 毫米, 宽 2—2.5 毫米。长角果卵圆状长圆形或宽条形, 长约 2 厘米, 宽 5—8 毫米, 顶端急尖, 扁平, 略扭转, 常无毛; 果瓣中脉明显, 花柱长约 0.5 毫