

2. 无花瓣; 种子每室 1 行..... 3. 无瓣蔊菜 *R. dubia* (Pers.) Hara
1. 短角果球形、近球形、圆柱形、椭圆形或长圆形。(高蔊菜例外)
4. 总状花序顶生, 花均具叶状苞片; 短角果圆柱形; 叶片羽状深裂或浅裂..... 4. 广州蔊菜 *R. cantoniensis* (Lour.) Ohwi
4. 总状花序顶生或腋生, 无苞片; 叶片羽状深裂至全裂、或大头羽裂。
5. 短果实球形或近球形。
6. 果实近球形, 直径 2—4 毫米, 熟时 4 瓣裂..... 7. 山芥叶蔊菜 *R. barbareaefolia* (DC.) Kitag.
6. 果实球形, 直径约 2 毫米, 熟时 2 裂..... 6. 风花菜 *R. globosa* (Turcz.) Hayek
5. 长角果圆柱形, 椭圆形或长圆形。
7. 果梗比果实短, 果实圆柱形, 长 1—2 厘米, 宽 2—4 毫米, 果瓣中肋明显, 紧靠果轴着生..... 5. 高蔊菜 *R. elata* (Hook. f. et Thoms.) Hand.-Mazz.
7. 果梗比果实长。
8. 叶片羽状深裂或大头羽裂; 果实椭圆形, 有时稍弯曲, 长 3—8 毫米, 宽 1—3 毫米, 果梗斜向开展..... 8. 沼生蔊菜 *R. islandica* (Oed.) Brob.
8. 叶片羽状深裂, 侧裂片远离生; 果实长圆形, 长 2—5 毫米, 宽 1—1.5 毫米, 果梗近水平开展或微向上弯..... 9. 辽东蔊菜 *R. liaotungensis* H. T. Tsui et Y. L. Chang

1. 欧亚蔊菜 图版 83:1—5

Rorippa sylvestris (L.) Bess. in Enum. Pl. Volh. 27. 1822; Hegi in Illustr. Fl. Mitt.-Europ. 4(1): 312. 1919; Vass. in Kom. Fl. URSS 8: 136. 1939; Valent. in T. G. Tutin et al. Fl. Europ. 1:283. 1964; Hedge in Rechinger Fl. Iran. 57/28: 217. 1968. — *Sisymbrium sylvestre* L. Sp. Pl. 657. 1753. — *Nasturium sylvestre* R. Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. 4:110. 1812.

一、二年生至多年生草本, 高 30—60 厘米, 植株近无毛。茎单一或基部分枝, 直立或呈铺散状。叶羽状全裂或羽状分裂, 下部叶有柄, 基部具小叶耳, 裂片披针形或近长圆形, 边缘具不整齐锯齿; 茎上部叶近无柄, 裂片渐狭小, 边缘齿渐少。总状花序顶生或腋生, 初密集成头状, 结果时延长; 萼片长椭圆形, 长 2—2.5 毫米, 宽约 1 毫米; 花瓣黄色, 宽匙形, 长 4—4.5 毫米, 宽约 1.5 毫米, 基部具爪, 瓣片具脉纹; 雄蕊 6, 近等长, 花丝扁平。长角果线状圆柱形, 微向上弯(未熟); 果梗纤细, 长 8—12 毫米, 近水平开展。花果期 5—9 月。

产新疆(伊宁)。生于田边、水沟边及潮湿地。亚洲及欧洲均有分布。模式标本采自德国。

2. 蔊菜(本草纲目) 印度蔊菜(江苏南部种子植物手册)、塘葛菜(岭南采药录)、蔊蒴(台湾植物志)、江剪刀草(上海、江苏)、香芥菜(江苏)、野油菜(浙江)、干油菜、野菜子、天菜子(四川)。图版 84:1—3

Rorippa indica (L.) Hiern in Cat. Afr. Pl. Welw. 1:26. 1896; Hara in Journ. Jap. Bot. 30(7): 193. 1955; 江苏南部种子植物手册 324. 1959; Ohwi, Fl. Jap. 468. 1965; 高等植物图鉴 2:59. 图 1847. 1972; 秦岭植物志 1(2): 382. 1974; Liu Tan-Shui in Hui-lin



1—5. 欧亚蔊菜 *Rorippa sylvestris* (L.) Bess.: 1—2. 植物全形, 3. 花, 4. 长、短雄蕊, 5. 果实。6—8. 辽东蔊菜 *Rorippa liaoritungensis* H. T. Tsui et T. L. Cheng: 6. 部分植株, 示叶及果序, 7. 花, 8. 果实。(韦力生绘)