

产西藏(拉萨、蒙达拉)。生于山坡草地,海拔 5000 米。模式标本采自西藏蒙达拉(现名洛扎)。

6. 宽果丛藤(植物分类学报) 梭罗加博、巴蓼草(西藏)

Solms-Laubachia eurycarpa (Maxim.) Botsch. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **17**:169. 1955; Y. C. Lan et T. Y. Cheo, 植物分类学报 **19**(4): 476. 1981. — *Parrya eurycarpa* Maxim. Fl. Tangut. **1**:56. t. 27, f. 16—24. 1889.

6a. 宽果丛藤(原变种) 图版 95:1—2

Solms-Laubachia eurycarpa (Maxim.) Botsch. var. **eurycarpa**

多年生草本,高 5—10 厘米。根粗壮,直径约 15 毫米,外面灰白色。茎多分枝,密被宿存老叶柄;近革质。叶多数,不为肉质,叶片椭圆形至倒披针形,长 2.5—5 厘米,宽约 16 毫米,顶端锐尖,基部楔形,侧脉显著,仅边缘具短柔毛;叶柄长 3—6 厘米。花未见(据文献记载,花葶自茎端抽出,具花 1 朵)。长角果镰状长椭圆形,长 3—7 厘米,宽 4—13 毫米,果瓣具中脉,顶端宿存花柱,长约 3 毫米,柱头 2 裂,基部宿存萼片及花瓣;萼片长椭圆形,长约 4 毫米,背面被长毛;花瓣倒卵形,长约 8 毫米,边缘被短柔毛;果梗长约 5 厘米。种子每室 2 行,5—8 粒,种子近圆形,长约 2.5 毫米,淡褐色。果期 8 月。

产青海(昂欠)、西藏(八宿、江达)。生于高山悬崖,海拔 4000—4100 米。模式标本采自西藏东部。

全草药用,止咳。

6b. 短柄丛藤(变种)(植物分类学报)

Solms-Laubachia eurycarpa var. **brevistipes** Y. C. Lan et T. Y. Cheo, 植物分类学报 **19**(4):476. 1981.

本变种与原变种的区别在于其叶较小,近革质,披针形或狭倒卵形,长 15—25 毫米,宽 3—6 毫米,侧脉不明显;叶柄短,长 10—15 毫米;宿存花柱长约 1.5 毫米,柱头 2 裂,果梗长达 1 厘米。

产青海(昂欠、曲麻莱、玉树)、甘肃、四川(德格)。生于山坡石滩、阴坡砂石干燥处,山顶碎石上,海拔 4500 米。模式标本采自青海昂欠。

7. 宽叶丛藤(植物分类学报) 图版 95:3—8

Solms-Laubachia latifolia (O. E. Schulz) Y. C. Lan et T. Y. Cheo, 植物分类学报 **19**(4):477. 1981. — *S.-L. pulcherrima* Muschl. var. **latifolia** O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin **11**:229. 1931.

多年生草本,高 5—10 厘米。根圆锥状,直径 5—15 毫米,外面深灰色。茎直立,分枝 1—6,密被老叶柄,革质,灰白色或紫红色。叶近肉质,倒卵形至窄披针形,长 2—5.5 厘米,宽约 1.6 厘米,顶端钝形,边缘近无毛,基部楔形,侧脉不显著;叶柄长 2—4 厘米。花未见。长角果长椭圆形或卵形,长 4—7.5 厘米,宽达 15 毫米,顶端宿存花柱,长约 0.5 毫