

式标本采自四川盐源。

13. 睫毛丛菴(植物分类学报) 图版 98:4—6

Solms-Laubachia ciliaris (Bur. et Franch.) Botsch. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **17**:169. 1955; Y. C. Lan et T. Y. Cheo, 植物分类学报 **19**(4): 479. 1981. — *Parrya ciliaris* Bur. et Franch. in Jour. Bot. Paris. **5**:20. 1891. — *P. finchiana* Dunn in Kew. Bull. 247. 1927.

一年生或多年生草本,高 1.5—2 厘米,主根短,纤细。茎直立或垫状,紧密丛生,密被宿存叶柄,边缘具睫毛。叶小,革质,多数,叶片狭短披针形,长 2—8 毫米,宽 1—5 毫米,顶端短尖或钝圆,上面密被刚毛,有时被 2 叉毛;叶柄长约 4 毫米,边缘被睫毛。花单生,数个,花未见(据文献记载萼片卵状披针形,钝头,边缘膜质,背面被毛;花瓣红色,卵形,比萼片长 1 倍,基部呈长爪;雄蕊短)。长角果绿色,狭长椭圆形,长约 10 毫米,宽 1—2 毫米;果瓣具中脉,宿存花柱长约 1 毫米;果梗长约 5 毫米。种子每室 1 行,2—4 粒,种子未熟。果期 7 月。

产四川(西昌)、云南(德钦)、西藏。生岩缝中,海拔 4100 米。模式标本采自西藏南部。

61. 四齿芥属——**Tetracme** Bunge

Bunge in Delect. Semin. Hort. Dorpat. 7. 1836; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. **17b**:560. 1936.


一年生分枝草本,植株被星状毛、分枝毛及单毛。叶片长披针形或宽线形,全缘或羽状浅裂,有柄或无柄。花序总状,密集或在结果时延伸,花微小;萼片直立,基部不呈囊状;花瓣白色或淡黄色,倒卵形或楔形,基部具短爪;雄蕊 6,分离,花丝基部有时加宽;侧蜜腺成对,微小,近圆锥形,中蜜腺缺。长角果近四棱形,直立或稍弯曲,果瓣具 3 脉,果实顶端具 4 枚角状附属物,直立或弯曲,果实紧贴果轴或微开展;果梗短粗,紧贴果轴。种子每室 1 行,种子卵形,无膜质边缘;子叶背倚胚根。

本属约 8 种,分布自地中海区东部至中亚、巴基斯坦及中国;我国有 3 种,均产于新疆。

本属模式种:四齿芥 *Tetracme quadricornis* (Steph.) Bunge

分种检索表

1. 叶全缘或具疏浅齿;花白色;长角果圆柱状至四棱形,微弯曲
..... 1. 四齿芥 *T. quadricornis* (Steph.) Bunge



1—3. 细叶丛藓 *Solms-Laubachia mino*: Hand.-Mazz.: 1. 全植株, 2. 叶片, 3. 长角果。
4—6. 睫毛丛藓 *Solms-Laubachia ciliaris* (Bur. et Franch.) Botsch.: 4. 全植株; 5.
叶片, 6. 长角果。(陈荣道绘)