

叶柄,长为叶片的2—3倍,上面有伏生的白色单毛,缘毛同形。无茎,花萼数个,自叶丛间生出,与叶等长或稍超出,顶生单花;萼片直立,稍开展,条形,长5—9毫米,外面有伏生白色单毛;花瓣粉红色或紫色,倒卵形,长约10毫米,顶端圆,基部渐窄成爪,与花瓣等长或稍长;子房线形,长约4毫米,无花柱,柱头圆锥状。长角果尚未成熟。(据记载:角果无毛,长4—7厘米,宽4—6毫米,通常弯曲,有中脉。)花期6—7月。

产新疆天山及昆仑山。生于山坡河滩或砾石地,海拔2600—4500米。分布于苏联及中亚。模式标本采自中亚地区。

本种的花有观赏价值。

3. 羽裂条果芥

Parrya pinnatifida Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. **15**: 147. 1842; Lédeb. Fl. Ross. **1**: 751. 1842; Regel et Schmalh. in Acta Hort. Pétrap. **5**: 235. 1877; N. Busch in Kom. Fl. URSS **8**: 262. 1939; Pavlov. Fl. Kazakhstan **4**: 249. 1961.

3a. 羽裂条果芥(原变种) 图版 104:1—2

Parrya pinnatifida Kar. et Kir. var. ***pinnatifida***

多年生草本,丛生,具有短柄小腺毛,老时脱落或存在。无茎;根状茎木质化,外面密被银灰色膜质枯萎的叶柄残基,呈鳞片状,上端分生几个极短的嫩枝,亦密被叶柄基部。叶基生,叶片长圆形,羽裂,深浅不等,长4—5厘米,宽10—15毫米,裂片呈三角状卵形,顶端尖或钝;叶柄比叶片稍短。花萼超过基生叶,高10—15厘米,上部有长角果3—5个;花未见。(据文献记载:萼片长9—10毫米;花瓣紫色,倒卵形或倒心形,长20—25毫米,爪长超过萼片近2倍。)长角果条形,长4—5厘米,宽约4毫米,果瓣扁而不平,有1明显的中脉,花柱扁,圆锥状,长约3毫米,柱头小,浅2裂;果梗长1.5—2.5厘米。种子每室1行,种子近圆形,扁平,径约2毫米,褐色,边缘有膜质透明乳白色宽翅。果期7—8月。

产新疆哈密沁城区。生于山坡。分布于苏联。模式标本采自阿拉套山脉。

变种检索表

- 1. 叶具有短柄小腺毛或老时脱落……………3a. 羽裂条果芥(原变种) var. ***pinnatifida***
- 1. 叶具单毛或无毛。
 - 2. 叶有较长的白色单毛,尤以叶片下面、脉上和边缘较多……………3b. 有毛条果芥 var. ***hirsuta*** N. Busch
 - 2. 叶无毛……………3c. 无毛条果芥 var. ***glabra*** N. Busch

3b. 有毛条果芥(变种)

Parrya pinnatifida var. ***hirsuta*** N. Busch in Kom. Fl. URSS **8**: 262. 1939.

本变种具有较长的白色单毛,尤以叶片下面、脉上和边缘较多;毛的基部较宽,有时呈