

Aufl. 17b: 572. 1936. p. p.

一年生至多年生草本，具单毛及有柄腺毛或无毛。萼片直立，内轮基部成囊状；花瓣紫色、堇色或白色，有长爪；侧蜜腺近环状，无中蜜腺。长角果圆柱状或侧扁，迟裂，果瓣具明显中脉及侧脉，花柱短，柱头2裂，裂片直立，离生；种子每室1行；子叶缘倚胚根。

约6种，产亚洲中部及欧洲；我国有1变种。

本属和香花芥属 *Hesperis* 相近，区别为本属子叶缘倚胚根。

1. 腺果香芥

Clausia turkestanica Lipsky var. ***glandulosissima*** Lipsky in Acta Hort. Petrop. 23: 43. 1904; Vass. in Kom. Fl. URSS 8: 253. 1939.

多年生草本，高30—100厘米，具有柄球形腺毛及单毛；茎单一或有分枝。基生叶及下部茎生叶长圆形，有叶柄；中部茎生叶窄卵状长圆形，长6—7厘米，宽1.5—2.5厘米，顶端急尖，基部楔形，边缘有波状齿或近全缘，近无柄或无柄。总状花序顶生，果期延长达40厘米；萼片长圆形，长4—5毫米，外面有柔毛；花瓣长圆形，长5—6毫米，有细脉纹，具爪，长6—7毫米。长角果近圆柱形，长6—8毫米，直径1—1.5毫米，直立，具柔毛及腺毛，被假隔膜分成多室，每室有1个种子，花柱长约1毫米；果梗增粗，长5—8毫米，有柔毛及具柄腺毛。种子长圆形，长约1.5毫米，黑棕色。花、果期7—8月。

产新疆。生在山坡。伊朗、阿富汗及苏联中亚均有分布。模式标本采自苏联中亚。

71. 异药芥属——*Atelantha* Hook. f. et Thoms.

Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn Soc. Bot. 5: 138. 1861; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 133. 1872; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 522. 1936.

一年生矮小草本。茎单一，直立，丝状但坚硬，具贴生2节粗毛。叶数片，远离；无基生叶；茎生叶近对生至互生，无柄，叶片长圆状椭圆形，顶端圆形，全缘。总状花序疏松，有少数花；花小，白色（有时成紫色）；萼片直立，基部不成囊状；花瓣长圆形，长约为萼片的2倍；雄蕊2型：2短雄蕊具2室花药，4长雄蕊具1室花药；侧蜜腺成对，长圆柱状，无中蜜腺；子房有14—24胚珠。长角果线形，近扁平圆柱状，2室，开裂，裂时常扭转；果瓣具贴生毛，有1脉，柱头稍2裂，花柱近无或无。种子每室1行，小，长圆形，无翅；子叶宿存，对生，背倚胚根。

仅1种，产喜马拉雅地区、帕米尔高原、巴基斯坦及阿富汗；我国西藏也有。

本属模式种：异药芥：*Atelantha perpusilla* Hook. f. et Thoms.

1. 异药芥

Atelantha perpusilla Hook. f. et Thoms. l. c. 138; Hook. f. et T. Anders. l. c. 133; Vass. in Kom. Fl. URSS 8: 272. 1939; Jafri, Fl. West Pakist. 55: 227. f.

30, H et t. 4. f. 29, 1973.

一年生矮小草本,在果期高 3—5(—10) 厘米。茎单一,直立,具贴生 2 节毛。叶无柄,叶片长圆形至线形,长 10—15 毫米,宽 1—3 毫米,全缘。总状花序有 2—5 花;花白色或后变成紫色,直径约 3 毫米;花梗不显著,长约 1 毫米;萼片长约 2 毫米;花瓣长圆形,长约 3.5 毫米。长角果线形,长约 20 毫米,宽约 1 毫米,近圆柱形扁平,具贴生毛,直立或拱曲;花柱长约 1 毫米。种子每室 (4—)6—12 个,长圆形,长约 0.7 毫米。

产西藏西部。分布同属。模式标本采自西藏。

未采到标本,描写从有关文献节译。

72. 隐子芥属——*Cryptospora* Kar. et Kir.

Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Moscou **15**: 161. 1842; Benth. et Hook.

f. Gen. Pl. **1**: 101. 1862; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat.

Pflanzenfam. 2. Aufl. **17b**: 573. 1936.

一年生草本;茎直立,多从基部分枝。叶披针形,边缘有锯齿,无柄。总状花序短,果期延长;花微小;花梗极短;萼片近直立,内轮不成囊状;花瓣倒卵形,顶部明显微缺,有脉纹;侧蜜腺半环形,两端增厚,外面开口,无中蜜腺;子房有 3—7 胚珠,花柱很短,柱头具 2 直立裂片。长角果圆柱形,较短,渐尖,向外弯,不裂,具 3—6 个种子,在种子间断裂。种子每室 1 行,种子大,长圆形;子叶背倚胚根。

2 种,苏联西伯利亚、中亚有分布;我国有 1 种。

本属模式种: *Cryptospora falcata* Kar. et Kir.

1. 隐子芥

Cryptospora falcata Kar. et Kir. l. c. 160; N. Busch, Fl. Sib. et Orient. Extr. **6**: 597. 1931; Vass. in Kom. Fl. URSS **8**: 285. 1939; Hedge in Rechinger, Fl. Iran. **57**: 277. 1968.

一年生草本,高 10—40 厘米;茎直立,有分枝,密生小分叉毛及硬长单毛。叶片长圆披针形,全缘或有少数锯齿,有分叉毛,无柄。萼片披针形,长 2—3 毫米,外面有毛;花瓣白色,倒卵形,比萼片稍长,顶端微缺,爪窄。长角果镰刀形或弧曲,长 15—35 毫米,宽 1.8—2.5 毫米,从顶端渐变窄,密生分叉毛;柱头微 2 裂;果梗长 3—5 毫米,紧贴茎。种子长圆形,长约 3 毫米,棕红色。花期 6—7 月,果期 7—8 月。

产新疆。生在山坡。苏联西伯利亚、中亚以及伊朗有分布。模式标本采自苏联中亚。未见标本,自《苏联植物志》节译。