

Aufl. 17b: 572. 1936. p. p.

一年生至多年生草本，具单毛及有柄腺毛或无毛。萼片直立，内轮基部成囊状；花瓣紫色、堇色或白色，有长爪；侧蜜腺近环状，无中蜜腺。长角果圆柱状或侧扁，迟裂，果瓣具明显中脉及侧脉，花柱短，柱头2裂，裂片直立，离生；种子每室1行；子叶缘倚胚根。

约6种，产亚洲中部及欧洲；我国有1变种。

本属和香花芥属 *Hesperis* 相近，区别为本属子叶缘倚胚根。

1. 腺果香芥

Clausia turkestanica Lipsky var. ***glandulosissima*** Lipsky in Acta Hort. Petrop. 23: 43. 1904; Vass. in Kom. Fl. URSS 8: 253. 1939.

多年生草本，高30—100厘米，具有柄球形腺毛及单毛；茎单一或有分枝。基生叶及下部茎生叶长圆形，有叶柄；中部茎生叶窄卵状长圆形，长6—7厘米，宽1.5—2.5厘米，顶端急尖，基部楔形，边缘有波状齿或近全缘，近无柄或无柄。总状花序顶生，果期延长达40厘米；萼片长圆形，长4—5毫米，外面有柔毛；花瓣长圆形，长5—6毫米，有细脉纹，具爪，长6—7毫米。长角果近圆柱形，长6—8毫米，直径1—1.5毫米，直立，具柔毛及腺毛，被假隔膜分成多室，每室有1个种子，花柱长约1毫米；果梗增粗，长5—8毫米，有柔毛及具柄腺毛。种子长圆形，长约1.5毫米，黑棕色。花、果期7—8月。

产新疆。生在山坡。伊朗、阿富汗及苏联中亚均有分布。模式标本采自苏联中亚。

71. 异药芥属——*Atelantha* Hook. f. et Thoms.

Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn Soc. Bot. 5: 138. 1861; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 133. 1872; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 522. 1936.

一年生矮小草本。茎单一，直立，丝状但坚硬，具贴生2节粗毛。叶数片，远离；无基生叶；茎生叶近对生至互生，无柄，叶片长圆状椭圆形，顶端圆形，全缘。总状花序疏松，有少数花；花小，白色（有时成紫色）；萼片直立，基部不成囊状；花瓣长圆形，长约为萼片的2倍；雄蕊2型：2短雄蕊具2室花药，4长雄蕊具1室花药；侧蜜腺成对，长圆柱状，无中蜜腺；子房有14—24胚珠。长角果线形，近扁平圆柱状，2室，开裂，裂时常扭转；果瓣具贴生毛，有1脉，柱头稍2裂，花柱近无或无。种子每室1行，小，长圆形，无翅；子叶宿存，对生，背倚胚根。

仅1种，产喜马拉雅地区、帕米尔高原、巴基斯坦及阿富汗；我国西藏也有。

本属模式种：异药芥：*Atelantha perpusilla* Hook. f. et Thoms.

1. 异药芥

Atelantha perpusilla Hook. f. et Thoms. l. c. 138; Hook. f. et T. Anders. l. c. 133; Vass. in Kom. Fl. URSS 8: 272. 1939; Jafri, Fl. West Pakist. 55: 227. f.