

30, H et t. 4. f. 29, 1973.

一年生矮小草本,在果期高3—5(—10)厘米。茎单一,直立,具贴生2节毛。叶无柄,叶片长圆形至线形,长10—15毫米,宽1—3毫米,全缘。总状花序有2—5花;花白色或后变成紫色,直径约3毫米;花梗不显著,长约1毫米;萼片长约2毫米;花瓣长圆形,长约3.5毫米。长角果线形,长约20毫米,宽约1毫米,近圆柱形扁平,具贴生毛,直立或拱曲;花柱长约1毫米。种子每室(4—)6—12个,长圆形,长约0.7毫米。

产西藏西部。分布同属。模式标本采自西藏。

未采到标本,描写从有关文献节译。

## 72. 隐子芥属——*Cryptospora* Kar. et Kir.

Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Moscou **15**: 161. 1842; Benth. et Hook.

f. Gen. Pl. **1**: 101. 1862; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat.

Pflanzenfam. 2. Aufl. **17b**: 573. 1936.

一年生草本;茎直立,多从基部分枝。叶披针形,边缘有锯齿,无柄。总状花序短,果期延长;花微小;花梗极短;萼片近直立,内轮不成囊状;花瓣倒卵形,顶部明显微缺,有脉纹;侧蜜腺半环形,两端增厚,外面开口,无中蜜腺;子房有3—7胚珠,花柱很短,柱头具2直立裂片。长角果圆柱形,较短,渐尖,向外弯,不裂,具3—6个种子,在种子间断裂。种子每室1行,种子大,长圆形;子叶背倚胚根。

2种,苏联西伯利亚、中亚有分布;我国有1种。

本属模式种: *Cryptospora falcata* Kar. et Kir.

### 1. 隐子芥

***Cryptospora falcata*** Kar. et Kir. l. c. 160; N. Busch, Fl. Sib. et Orient. Extr. **6**: 597. 1931; Vass. in Kom. Fl. URSS **8**: 285. 1939; Hedge in Rechinger, Fl. Iran. **57**: 277. 1968.

一年生草本,高10—40厘米;茎直立,有分枝,密生小分叉毛及硬长单毛。叶片长圆披针形,全缘或有少数锯齿,有分叉毛,无柄。萼片披针形,长2—3毫米,外面有毛;花瓣白色,倒卵形,比萼片稍长,顶端微缺,爪窄。长角果镰刀形或弧曲,长15—35毫米,宽1.8—2.5毫米,从顶端渐变窄,密生分叉毛;柱头微2裂;果梗长3—5毫米,紧贴茎。种子长圆形,长约3毫米,棕红色。花期6—7月,果期7—8月。

产新疆。生在山坡。苏联西伯利亚、中亚以及伊朗有分布。模式标本采自苏联中亚。未见标本,自《苏联植物志》节译。