

果梗长5—7毫米。花期5月,果期8月。

产新疆。生在沙丘上。苏联有分布。模式标本采自苏联。

77. 桂竹香属——*Cheiranthus* L.

L. Sp. Pl. 661. 1753; et Gen. Pl. ed. 5. 297. 1754; Benth. et
Hook. f. Gen. Pl. 1: 68. 1862; O. E. Schulz in Engl. et Prantl. Nat.
Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 579. 1936.

多年生草本或半灌木,具贴生2叉丁字毛,少数有3—4叉分叉毛。萼片直立,具白色膜质边缘,内轮基部成囊状;花瓣大,黄色、白色、紫色或玫瑰红色,具宽网脉及长爪;侧蜜腺杯状,有时两侧浅裂,无中蜜腺;子房少数有极短柄,柄线形,有多数胚珠,花柱短,柱头成二极叉开、深裂。长角果宽或窄线形,4棱状,背面极压扁,果瓣具显明中脉。种子每室近2行排列,种子大,顶端有翅;子叶背倚胚根。

近10种,欧洲及亚洲有分布;我国有3种。

本属和糖芥属 *Erysimum* 极相近,区别在于:前者无中蜜腺,长角果背部扁压及种子近2行排列。

本属模式种: 桂竹香 *Cheiranthus cheiri* L.

分种检索表

1. 匍匐植物,有或无茎,高3—10厘米;叶卵形或长圆形,长1—2厘米;花较小,黄色,直径8—10毫米。
 2. 茎高3—10厘米;总状花序具多数花 1a. 匍匐桂竹香(原变种) *Ch. forrestii* (W. W. Smith) Hand.-Mazz. var. *forrestii*
 2. 植物无茎;花萼顶端只有1朵花 1b. 无茎桂竹香 *Ch. forrestii* var. *acaulis* (Hand.-Mazz.) K.C. Kuan
1. 茎直立,较高,高12—60厘米;叶倒披针形、披针形或线形;花较大。
 3. 花粉红色或紫色,直径1.5—2厘米,长角果长2—3.5厘米;果梗增粗,长4—5毫米;高山野生 2. 红紫桂竹香 *Ch. roseus* Maxim.
 3. 花桔黄色或黄褐色,直径2—2.5厘米;长角果长4—7.5厘米;果梗长1—1.5厘米 3. 桂竹香 *Ch. cheiri* L.

1. 匍匐桂竹香

Cheiranthus forrestii (W. W. Smith) Hand.-Mazz. in Sitzg. Akad. Wiss. Wien
25. 1925. et Symb. Sin. 7(2): 365. 1931; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 3: 112.
1949. — *Parrya forrestii* W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 8: 195. 1914.

1a. 匍匐桂竹香(原变种) 图版113: 4—6