

自新疆天山。

5. 川滇山蕓菜(中国高等植物图鉴) 图版 116: 4—6

Eutrema lancifolium (Franch.) O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **86** (4. 105): 35. 1924; 中国高等植物图鉴 **2**: 67. 图 1863. 1972. ——*Goldbachia lancifolia* Franch. in Bull. Soc. Bot. France. **33**: 408. 1886. et Pl. Delav. **68**. 1889.

多年生草本, 高 20—50 厘米, 根茎直立, 具残存枯叶柄; 茎不分枝或在上部分枝, 下部无毛, 上部有单毛。基生叶与下部茎生叶具柄, 柄基部较宽, 两侧有较密的睫毛, 叶片披针形或窄卵形, 长 5—6.5 厘米, 宽 2—3 厘米, 顶端钝圆, 基部楔状圆形; 茎上部叶无柄, 叶片披针形或长圆状披针形, 向上渐小, 顶端渐尖, 基部楔形至心形, 全缘或有不明显的齿或微齿, 叶片基部有单毛, 沿叶脉特别显著。花序呈疏松伞房状, 果期伸长, 稀有最下部数花有苞叶; 花梗长 2—3 毫米; 萼片长卵圆形, 长 1.5—2.5 毫米, 宽约 0.75 毫米; 花瓣白色, 长圆状倒卵形, 长 2.5—3 毫米, 宽约 1 毫米, 顶端钝圆, 基部渐窄, 爪不明显; 花丝短, 基部渐宽。角果绿色, 四棱状纺锤形或披针形, 长 9—13 毫米, 宽 1.5—2 毫米; 果瓣中脉明显, 顶端尖, 基部钝圆; 隔膜无脉; 果梗长 1—2 厘米, 斜向上或近水平展开。种子每室 2 粒, 种子长圆形, 长 4—4.5 毫米, 宽 1.5—2 毫米, 褐色。花期 6—7 月。

产甘肃、四川西部、云南西北部、西藏东南部和南部。生于山地草丛中、林下或沟边, 海拔 3800—4000 米。模式标本采自云南丽江。

6. 三角叶山蕓菜

Eutrema deltoideum (Hook. f. et Thoms.) O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **86** (4. 105): 35. 1924. ——*Sisymbrium deltoideum* Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot., **5**: 163. 1861; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 151. 1872.

6a. 三角叶山蕓菜(原变种)

Eutrema deltoideum (Hook. f. et Thoms.) O. E. Schulz var. **deltoideum**

多年生草本, 高达 60 厘米, 根茎横卧, 粗约 1 厘米, 褐色; 茎直立, 不分枝。基生叶具柄, 柄长 3—4 厘米, 具棱与槽, 叶片心状圆形, 长约 2.3 厘米, 宽约 2.8 厘米, 顶端钝或渐尖, 基部深心形, 边缘具波状齿, 叶脉末端稍增厚; 茎生叶具短柄, 叶片长圆状三角形, 向上渐窄, 顶端渐尖, 略呈心形, 向上为截形或稍收缩, 边缘具波状齿、疏锯齿或凹波缘。花序圆锥状, 果期伸长; 花梗细长, 长约 5 毫米; 萼片淡黄色, 宽椭圆形, 长约 1.5 毫米, 顶端钝圆, 有宽的边缘; 花瓣白色, 干后带淡红色, 长圆状倒卵形, 长约 4 毫米, 宽约 2 毫米, 顶端钝圆, 具短爪。长角果窄披针形, 长 12—21 毫米, 宽约 1.5 毫米, 顶端渐细; 果瓣呈龙骨状隆起; 隔膜常在上部穿孔; 果梗丝状, 长 8—15 毫米, 水平展开或稍斜向上。种柄丝状, 种子长圆状椭圆形, 长约 3 毫米, 棕色, 表面有纵行纹理。花期 6 月。

产四川、西藏, 海拔 2800—5000 米。锡金也有分布。模式标本采自锡金。

6b. 大花山蕓菜(变种) 图版 116: 7—8



1—3.山萮菜 *Eutrema yunnanense* Franch. var. *yunnanense*: 1.植株, 2.上部带花枝条,
3.花。4—6.川滇山萮菜 *Eutrema lancifolium* (Franch.) O. E. Schulz: 4.植株基部,
5.植株上部, 6.花。7—8.大花山萮菜 *Eutrema deltoideum* (Hook. f. et Thoms.) O. E.
Schulz var. *grandiflorum* O. E. Schulz: 7.植株, 8.花。(史渭清绘)