

筒形,有时卵形或近球形,具钝3棱,顶部具3裂片;种子肾形,黑色,平滑,有光泽,长约2毫米。花果期6—8月。

见于辽宁省的金县、旅顺等地。本植物为外来种,常沿铁路旁山坡生长或生于岛屿(旅顺海猫岛),逸为野生。产欧洲、亚洲西部、非洲北部。

2. 川犀草属*——*Oligomeris* Cambess. (nom. cons.)

Cambess. in Jacq. Voy. Bot. 23. t. 25. 1839 (1844); Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 112. 1862; M. S. Abdullah, Resed. 1: 69. 1967.——*Resedella* Webb. et Berthelot, Hist. Nat. Iles Canaries 3 (2. 1): 106. 1837.——*Dipetalia* Rafin. Fl. Tell. 3: 73. 1837 (1836).

草本。叶线形,不分裂,散生或簇生。花小,疏花,组成顶生的穗状花序;花萼常4深裂;花瓣2片,分离或基部合生;花盘缺;雄蕊3—8枚,分离或基部合生;子房无柄,具4棱,具4胎座,有多数胚珠。蒴果有角棱,顶部开裂;种子多数。

约10种,分布于非洲、亚洲、美洲。我国有1种,产四川。本属在我国为分布新记录。

本属的模式种: *Oligomeris linifolia* (Vahl) Macbride.

1. 川犀草(新拟) 图版2

Oligomeris linifolia (Vahl) Macbride in Contr. Gray Herb. n. s. 53: 13. 1918; Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Brux. Suppl. 24: 161. 1954; J. K. Mashewari, Fl. Delhi 66. 1963; K. H. Rechinger, Fl. Lowland Iraq 324. 1964; M. S. Abdullah, Resed. 1: 77. 1967.——*Reseda linifolia* Vahl in Hornemann, Hort. Hafn. 2: 501. 1815.——*Oligomeris glaucescens* Cambess. in Jacq. Voy. Bot. 24, t. 25. 1844; Hk. f. & Thoms. in Hk. f. Fl. Brit. Ind. 1: 181. 1872.

多分枝、直立草本,高10—40厘米,全株无毛;茎淡绿色。叶散生或簇生,无柄或近无柄,绿色,线形,全缘,顶端钝或急尖,长1—5厘米,宽0.5—2毫米。花小,淡绿白色,无柄或近无柄,组成纤细、顶生的穗状花序;小苞片披针形,长约1.8毫米;花萼4深裂,裂片线状披针形;花瓣稍短于萼裂片;雄蕊3枚,花丝在基部合生,生于花的腹面;子房具棱。蒴果近球形,淡黄色,无柄或近无柄,有角棱,顶部4裂,径约2毫米;种子多数,黑色或淡绿色,有光泽。花果期6—7月。

* 属名为新拟。