

形,长约 0.8 毫米,黑色,种皮脉纹加厚成蜂房格状。 花果期 5—10 月。

产于广西东南部至广东西南部及其沿海岛屿。模式标本采自广西。

本种与匙叶茅膏菜 *D. spathulata* Labill. 不同处在于,叶较长(1.5—4.4 厘米),叶片通常倒披针形至线形,未开展的幼叶二次折叠;花序和萼近无毛;药扩大;花柱较长,顶端分枝。

5. 圆叶茅膏菜(中国高等植物图鉴) 毛毡苔(通称)

Drosera rotundifolia L. Sp. Pl. 281. 1753; DC. Prodr. 1: 318. 1824; Diels in Engl. Pflanzenr. 26 (IV. 112): 93. 1906; 中国高等植物图鉴, 2: 73. 1972.

5a. 圆叶茅膏菜(原变种) 图版 9: 1—6

Drosera rotundifolia L. var. *rotundifolia*

多年生草本,茎短。叶基生,密集,具长柄;叶片圆形或扁圆形,长 3—9 毫米,宽 5—12 毫米,叶缘具长头状粘腺毛,上面腺毛较短,背面常无毛;叶柄扁平,长 1—6 厘米,具毛或无毛;托叶膜质,长约 6 毫米,下半部紧贴叶柄,上半部开展,5—7 裂,裂片渐尖。螺旋聚伞花序 1—2 条,腋生,花萼状,纤细,直立,长 8.5—21 厘米,不分叉,具花 3—8 朵,花序梗和花轴被柔毛状腺毛或近无毛;苞片小,钻形;花梗长 1—3 毫米,与萼同被粉状毛;花萼长约 4 毫米,下部合生,上部 5 裂,裂片卵形或狭卵形,边缘疏具小腺齿;花瓣 5,白色,长约 5—6 毫米,匙形;雄蕊 5,长约 4—5 毫米;子房椭圆球形,长约 3 毫米,1 室,侧膜胎座 3,胚珠多数,花柱 3,每个 2 深裂至基部,棒状,顶端稍扩大。蒴果,熟后开裂为 3 果片;种子多数,椭圆球形,微具网状脉纹,外面包以囊状、疏松、两端延伸渐尖的外种皮。花期夏、秋季,果期秋、冬季。

产吉林和黑龙江。生于海拔 900—1000 米的山地湿草丛中。分布于欧洲中部和北部、亚洲和美洲北部等寒冷地带。

据载本种全草可作支气管炎祛痰药。

《东北植物检索表》中记有 *D. anglica* Huds. 一种,在这次资料清理中,曾看见一号吉林省抚松标本,其叶形与 *D. anglica* Huds. 相似,但未发现种子形状及其他特征与本种有异。由于资料不足,暂作本种处理。

5b. 叉梗茅膏菜(植物分类学报) 图版 9: 7—12

Drosera rotundifolia L. var. *furcata* Y. Z. Ruan 植物分类学报 19:340.1981。

与原变种不同处为花序通常较粗壮,常 1—2 回分叉;苞片通常线形,稀钻形;花柱 3—4,每个 2 深裂或其中 1 个不裂;果片 3—4。

产浙江、江西、湖南、福建和广东等省。生于 400—1500 米的疏林下或草丛中。