

2. 有球茎亚属 *Subg. Ergaletum* (DC.) Diels in Engl. Pflanzenr. 26 (1V. 112): 62. 1906. — *Drosera* sect. *Ergaletum* DC. Prodr. 1: 319. 1824.

地下茎基部具鳞茎状球茎;无托叶。花柱通常2分叉的多裂。

本亚属我国产2变种。

## 6. 茅膏菜 *Drosera peltata* Smith

6a. 茅膏菜(变种)(本草拾遗) 石龙茅草(植物名实图考); 盾叶茅膏菜(中国高等植物图鉴); 球子参(云南)、牛打架、山胡椒草、打古子、筋骨草、苍蝇王(四川) 图版10: 1—13

*Drosera peltata* Smith var. *multisepala* Y. Z. Ruan, 植物分类学报 19:341. 图2:1—13. 1981. — *Drosera peltata* Smith var. *lunata* auct. non Clarke (1879): Fl. E. Himal. 110. 1966; 中国高等植物图鉴 2: 74. 1972.

多年生草本,直立,有时攀援状,高9—32厘米,淡绿色,具紫红色汁液;鳞茎状球茎紫色,球形,直径1—8毫米;茎地下部分长1—4厘米,地上部分通常直,无毛或具乳突状黑色腺点,顶部3至多分枝。基生叶密集成近一轮或最上几片着生于节间伸长的茎上,退化、脱落或最下数片不退化、宿存;退化基生叶线状钻形,长约2毫米;不退化基生叶圆形或扁圆形,叶柄长2—8毫米,叶片长2—4毫米;茎生叶稀疏,盾状,互生;叶柄长8—13毫米;叶片半月形或半圆形,长2—3毫米,基部近截平,叶缘密具单一或成对而一长一短的头状粘腺毛,背面无毛。螺旋聚伞花序生于枝顶和茎顶,分叉或二歧状分枝,或不分枝,具花3—22朵;花序下部的苞片楔形或倒披针形,顶部具3—5腺齿或全缘,边缘无毛或被腺毛,两面无毛或背面密被腺毛,中、上部的苞片渐狭为钻形;花梗长6—20毫米;花萼长约4毫米,5—7裂,裂片大小不一,歪斜、一边具角的披针形或卵形,背面疏或密被长腺毛,边缘全部或仅中部以上密被长腺毛,整齐或仅顶部稍缺裂;花瓣楔形,白色、淡红色或红色,基部有黑点或无;雄蕊5,长约5毫米;子房近球形,淡绿色,无毛,1室,胚珠多数,花柱3—5,稀6,各2深裂,裂条顶部分别为2—3和3—5浅裂。蒴果长2—4毫米,3—5裂,稀6裂。种子椭圆形、卵形或球形,种皮脉纹加厚成蜂房格状。花果期6—9月。

产云南、四川西南部、贵州西部和西藏南部。生于1200—3650米的松林和疏林下,草丛或灌丛中,田边、水旁、草坪亦可见。模式标本采自四川。

本变种球茎生食会麻口,过量服食有毒。据载药用可治跌打损伤。

本变种随地理分布和生境不同,其形态变化较大,据连续变化情况仍可分出如下二种类型:

A. 披针萼型:萼5,裂片具角披针形,背面具疏腺毛;花柱3(—6);果片3(—6)。本型分布于云南大理以南者,植物体上部2—3分枝;花序常不分叉;种子椭圆形。分布于云南维西以北和四川西南部者,植物体上部常多分枝;花序常分叉或为二歧状分枝;种子圆球形。(图版10:8)