

3. 华北八宝 华北景天 (内蒙古植物志)

Hylotelephium tatarinowii (Maxim.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 52. f. 3a. 1977. — *Sedum tatarinowii* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 134. 1883; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 101. f. 50. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 69. pl. 28. f. 284—289. 1930; 中国高等植物图鉴 2: 82. 图 1894. 1972; 内蒙古植物志 3: 7. 图版 3, 图 4—6. 1977.

3a. 华北八宝 (原变种)

Hylotelephium tatarinowii (Maxim.) H. Ohba var. **tatarinowii**

多年生草本。根块状, 常有小形胡萝卜状的根。茎直立, 或倾斜, 多数, 高 10—15 厘米, 不分枝, 生叶多。叶互生, 狭倒披针形至倒披针形, 长 1.2—3 厘米, 宽 5—7 毫米, 先端渐尖, 钝, 基部渐狭, 边缘有疏锯齿至浅裂, 近有柄。伞房状花序宽 3—5 厘米; 花梗长 2—3.5 毫米; 萼片 5, 卵状披针形, 长 1—2 毫米, 先端稍急尖; 花瓣 5, 浅红色, 卵状披针形, 长 4—6 毫米, 宽 1.7—2 毫米, 先端浅尖; 雄蕊 10, 与花瓣稍同长, 花丝白色, 花药紫色; 鳞片 5, 近正方形, 长 0.5 毫米, 先端有微缺; 心皮 5, 直立, 卵状披针形, 长 4 毫米, 花柱长 1 毫米, 稍外弯。花期 7—8 月, 果期 9 月。

产山西、河北、内蒙古。生于海拔 1000—3000 米处山地石缝中。模式标本采自内蒙古阴山。

3b. 全缘华北八宝 (变种)

Hylotelephium tatarinowii (Maxim.) H. Ohba var. **integrifolium** (Palib.) S. H. Fu, comb. nov. — *Sedum tatarinowii* Maxim. var. *integrifolium* Palib. in Acta Hort. Petrop. 14: 120. 1895.

根状茎粗, 近球形; 茎多数。茎长 8—10 厘米。叶长 1.5—2 厘米, 宽 3—5 毫米, 全缘。花较小, 宽 6—8 毫米; 花瓣长 5 毫米。萼筒长 3 毫米。花期 7 月。

产河北北部董家营子 (模式产地)。未见标本, 根据原记载描述。

4. 圆扇八宝 圆扇景天 (湖北植物志) 金钱掌、仙人宝 (经济植物手册) 图版 15: 1—5

Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hk.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 52. f. 1a. 1977. — *Sedum sieboldii* Sweet ex Hk. in Curtis's Bot. Mag. 89: pl. 5358. 1863; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 136. 1883; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 101. f. 47a. 49. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 61. pro syn. 1930; 牧野, 日本植物图鉴 504. f. 1507. 1940; 湖北植物志 2: 59. 图 759. 1979.

多年生草本。块根肉质, 细长, 如胡萝卜。茎高 10—15 厘米, 匍匐上升。3 叶轮生, 叶圆形至圆扇形, 长 10—15 毫米, 宽 12—20 毫米, 先端钝急尖至钝圆, 基部楔形至宽楔