

形,边缘稍呈波状或几全缘,几无柄。伞形聚伞花序顶生,直径2—4厘米;苞片卵形,花梗长3—5毫米;萼片5,三角形,长1.5毫米,基部合生;花瓣5,浅红色,长圆状披针形,长4—5毫米,宽2毫米,先端急尖;雄蕊10,对瓣的与花瓣稍同长,对萼的比花瓣长,花药黄色;鳞片5,长圆状匙形,长0.8毫米,先端截形,或稍有微缺;心皮5,直立,狭卵形,长4—4.5毫米,花柱长1.5毫米在内。花期9月。

产湖北利川。生于山坡阴处岩石上。日本也有。模式标本采自日本栽培品种。

5. 狭穗八宝 狭穗景天(湖北植物志) 狮儿草(秦岭植物志)

Hylotelephium angustum (Maxim.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 48. 1977.——*Sedum angustum* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 138. 1883; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 1: 30. 1924; 中国高等植物图鉴 2: 83. 图 1895. 1972; 秦岭植物志, 2 卷 2 册, 414. 1974; 湖北植物志 2: 59. 图 790. 1979.——*Sedum telephium* L. ssp. *angustum* (Maxim.) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5: Append.: 64. pl. 24. 1930.

多年生草本。根状茎短,须根细。茎高50—100厘米。3—5叶轮生,叶长圆形,长4—7.5厘米,宽1.5—2厘米,先端渐尖,钝,基部渐狭,边缘有疏钝齿。花序顶生及腋生,紧密多花,分枝多,由聚伞状伞房花序组成外观为中断的穗状花序,长达30厘米以上;花梗与花约同长;萼片5,披针形,长1毫米,分离;花瓣5,淡红色,长圆形,长3毫米左右,先端渐尖,钝,基部渐狭,分离;雄蕊10,与花瓣约同长,或超出;鳞片5,长圆形,长0.8毫米,宽0.4毫米。蒴果直立,长圆形,长4毫米,基部渐狭,分离,喙短;种子少数。花期8月。

产云南、四川、湖北西部、青海东部、甘肃、陕西、山西。生于海拔1850—3500米处的山坡或沟边灌丛中、疏林中、石上。模式标本采自青海大通河。

6. 轮叶八宝 轮叶景天(拉汉种子植物名称) 一代宗(陕西)、还魂草(秦岭植物志) 岩三七、胡豆七(湖北)

Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 54. f. 3f. 1977.——*Sedum verticillatum* L. Sp. Pl. 430. 1753; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 139. 1883; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 94. f. 44. 1921; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 59. 1939; 刘慎谔等, 东北植物检索表 128. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 83. 图 1896. 1972; 秦岭植物志 2 卷 2 册: 415. 图 355. 1974; Fl. Coreana 3: 55. f. 47. 1974; 湖北植物志 2: 60. 图 761. 1979.——*Sedum telephium* L. f. *verticillatum* (L.) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 1: 30. pl. 12: 2—4. f. 1, 17, 2: 1—3. 1924.——*Sedum telephium* L. ssp. *verticillatum* (L.) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5: Append.: 64. pl. 25. f. 254—259. 1930.