

多年生草本。须根细。茎高40—100厘米，直立，不分枝。4叶少有5叶轮生，下部的常为3叶轮生或对生，叶比节间长，长圆状披针形至卵状披针形，长4—8厘米，宽2.5—3.5厘米，先端急尖，钝，基部楔形，边缘有整齐的疏牙齿，叶下面常带苍白色，叶有柄。聚伞状伞房花序顶生；花密生，顶半圆球形，直径2—6厘米；苞片卵形；萼片5，三角状卵形，长0.5—1毫米，基部稍合生；花瓣5，淡绿色至黄白色，长圆状椭圆形，长3.5—5毫米，先端急尖，基部渐狭，分离；雄蕊10，对萼的较花瓣稍长，对瓣的稍短；鳞片5，线状楔形，长约1毫米，先端有微缺；心皮5，倒卵形至长圆形，长2.5—5毫米，有短柄，花柱短。种子狭长圆形，长0.7毫米，淡褐色。花期7—8月，果期9月。

产四川、湖北、安徽、江苏、浙江、甘肃、陕西、河南、山东、山西、河北、辽宁、吉林。生于海拔900—2900米的山坡草丛中或沟边阴湿处。朝鲜、日本、苏联也有。模式标本采自苏联堪察加。

药用，全草外敷，可止痛止血（湖北西部）。

7. 珠芽八宝 珠萌景天，零余子景天（东北植物检索表） 图版 15: 6—10


Hylotelephium viviparum (Maxim.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 55. f. 3e. 1977. — *Sedum viviparum* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 137. 1883; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 61. 1939; 刘慎谔等，东北植物检索表 128. 图版 32. 图 7. 1959; Fl. Coreana 3: 55. f. 48. 1974. — *Sedum telephium* L. ssp. *viviparum* (Maxim.) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 65. pl. 26. f. 260—268. 1930.

多年生草本。须根短。茎高15—60厘米，单生或数条着生，直立，不分枝。3—4叶轮生，叶比节间短，卵状披针形或卵状长圆形，长2—4厘米，宽7—12毫米，先端渐尖，钝，基部渐狭，在叶腋有带白色肉质的芽，边缘有疏浅牙齿，几无柄，细脉明显。聚伞状伞房花序，花密生，顶半圆球形；苞片似叶而小；萼片5，卵形，长1毫米；花瓣5，黄白色或黄绿色，卵形或长圆形，长3毫米，宽1.5毫米，先端尖；雄蕊10，对萼的与花瓣稍同长或稍长，对瓣的稍短，花药球形，黄色；鳞片5，线状楔形，长0.7毫米；心皮5，宽卵形，长2毫米，花柱线形，基部狭，入于短柄。花期8—9月。

产辽宁及吉林东部。生于海拔900米山坡林下石上。朝鲜及苏联远东地区也有。模式标本采自我国东北及苏联符拉迪沃斯托克（海参崴）附近。

8. 八宝（北京） 景天（北京），活血三七（内蒙古植物志），对叶景天（东北植物检索表），白花蝎子草（经济植物手册） 图版 15: 11—15

Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 50. f. 1f. 1977. — *Sedum erythrostictum* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.—Bat. 2: 155. 1865; Hara in Journ. Jap. Bot. 27: 379. 1952; 中国高等植物图鉴 2: 84. 图 1897. 1972; Fl. Coreana 3: 58. f. 50. 1974; 内蒙古植物志 3: 5. 图版 3, 图 1—3.



1—5. 圆扇八宝 *Hylotelephium sieboldii* (Sweet ex Hk.) H. Ohba: 1. 植株; 2. 萼片; 3. 花瓣及雄蕊; 4. 鳞片; 5. 心皮。6—10. 珠芽八宝 *Hylotelephium viviparum* (Maxim.) H. Ohba: 6. 花枝; 7. 萼片; 8. 花瓣及雄蕊; 9. 鳞片; 10. 心皮。11—15. 八宝 *Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba: 11. 花枝; 12. 萼片; 13. 花瓣及雄蕊; 14. 鳞片; 15. 萼囊。16—21. 紫花八宝 *Hylotelephium mingjinianum* (S. H. Fu) H. Ohba: 16. 植株; 17. 萼片; 18. 花瓣及雄蕊; 19. 鳞片; 20. 心皮; 21. 种子。(钱存源绘)