

披针形,长1毫米,渐尖;花瓣5,淡紫红色至紫红色,披针形至宽披针形,长4—5毫米,雄蕊10,长6—8毫米,花药紫色;鳞片5,长方形,长1—1.2毫米,先端有微缺;心皮5,狭椭圆形,长4.2毫米,花柱长1.2毫米在内。蓇葖直立。花期8—9月,果期9—10月。

产安徽、陕西、河南、山东、河北、辽宁、吉林、黑龙江。生于低山多石山坡上。朝鲜也有。模式标本采自华北?

久经栽培作观赏用。

9b. 狭叶长药八宝 (变种) 狭叶长药景天 (东北植物检索表)

*Hylotelephium spectabile* (Bor.) H. Ohba var. *angustifolium* (Kitagawa) S. H. Fu, 东北林学院植物研究室汇刊 no. 6: 73. 1980. — *Sedum spectabile* Bor. var. *angustifolium* Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. IV. Pt. 4: 86. 1936; 刘慎谔等, 东北植物检索表 126. 1959.

叶较小较狭,狭椭圆状长圆形,长2.5—5厘米,宽8—15毫米,边缘有牙齿。

产河北北部(模式产地)、辽宁、吉林。生于石质山坡、林边。

10. 心叶八宝 心叶景天 (东北林学院植物研究汇刊)

*Hylotelephium pseudospectabile* (Praeg.) S. H. Fu, 东北林学院植物研究室汇刊 6: 73. 1980. *Sedum pseudospectabile* Praeg. in Journ. Bot. 55: 40. 1917; id. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 90. f. 36e, 42. 1921.

多年生草本。块根肉质,胡萝卜状。茎少数,直立,高30—60厘米,不分枝。3叶轮生,稀对生或4叶轮生,下部叶倒卵形,上部叶卵状长圆形,长3.5—7厘米,宽1.5—4厘米,较节间稍长或稍短,先端急尖,钝,基部略呈心形而抱茎,全缘,或有疏浅牙齿,无柄。聚伞花序伞房状,长4—5厘米,宽5—7厘米,苞片少;花梗较花稍短;萼片5,卵状披针形,长1—1.5毫米;花瓣5,浅红色,卵状披针形,长3.5—4.5毫米,先端急尖;雄蕊10,长达6毫米,直立,花丝粉红色,花药紫色;鳞片10,长方状楔形,长0.6毫米;心皮5,狭披针形,长3.5—4毫米,花柱稍外弯。种子狭长圆形,长0.8毫米,褐色。花期8—9月,果期10月。

产河北秦皇岛、辽宁凤城及吉林东南部。生于海拔1000米的山坡石上。朝鲜、日本也有。模式标本采自河北秦皇岛。

11. 紫花八宝 名金景天 (植物分类学报增刊)、紫花景天 (湖北植物志) 图版 15: 16—21

*Hylotelephium mingjinianum* (S. H. Fu) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 51. f. 3h. 1977. — *Sedum mingjinianum* S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 113. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 84. 图 1898. 1972. — *Sedum telephium* L. ssp. *alboroseum* (Baker) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 61, p. p., quoad pl. 23: 1. f. 242—247. 1930. excl. descr. et syn.; 湖北植物志 2: 61. 图 763. 1979.