

披针形,长1毫米,渐尖;花瓣5,淡紫红色至紫红色,披针形至宽披针形,长4—5毫米,雄蕊10,长6—8毫米,花药紫色;鳞片5,长方形,长1—1.2毫米,先端有微缺;心皮5,狭椭圆形,长4.2毫米,花柱长1.2毫米在内。蓇葖直立。花期8—9月,果期9—10月。

产安徽、陕西、河南、山东、河北、辽宁、吉林、黑龙江。生于低山多石山坡上。朝鲜也有。模式标本采自华北?

久经栽培作观赏用。

9b. 狭叶长药八宝 (变种) 狭叶长药景天 (东北植物检索表)

Hylotelephium spectabile (Bor.) H. Ohba var. *angustifolium* (Kitagawa) S. H. Fu, 东北林学院植物研究室汇刊 no. 6: 73. 1980. — *Sedum spectabile* Bor. var. *angustifolium* Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. IV. Pt. 4: 86. 1936; 刘慎谔等, 东北植物检索表 126. 1959.

叶较小较狭,狭椭圆状长圆形,长2.5—5厘米,宽8—15毫米,边缘有牙齿。

产河北北部(模式产地)、辽宁、吉林。生于石质山坡、林边。

10. 心叶八宝 心叶景天 (东北林学院植物研究汇刊)

Hylotelephium pseudospectabile (Praeg.) S. H. Fu, 东北林学院植物研究室汇刊 6: 73. 1980. *Sedum pseudospectabile* Praeg. in Journ. Bot. 55: 40. 1917; id. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 90. f. 36e, 42. 1921.

多年生草本。块根肉质,胡萝卜状。茎少数,直立,高30—60厘米,不分枝。3叶轮生,稀对生或4叶轮生,下部叶倒卵形,上部叶卵状长圆形,长3.5—7厘米,宽1.5—4厘米,较节间稍长或稍短,先端急尖,钝,基部略呈心形而抱茎,全缘,或有疏浅牙齿,无柄。聚伞花序伞房状,长4—5厘米,宽5—7厘米,苞片少;花梗较花稍短;萼片5,卵状披针形,长1—1.5毫米;花瓣5,浅红色,卵状披针形,长3.5—4.5毫米,先端急尖;雄蕊10,长达6毫米,直立,花丝粉红色,花药紫色;鳞片10,长方状楔形,长0.6毫米;心皮5,狭披针形,长3.5—4毫米,花柱稍外弯。种子狭长圆形,长0.8毫米,褐色。花期8—9月,果期10月。

产河北秦皇岛、辽宁凤城及吉林东南部。生于海拔1000米的山坡石上。朝鲜、日本也有。模式标本采自河北秦皇岛。

11. 紫花八宝 名金景天 (植物分类学报增刊)、紫花景天 (湖北植物志) 图版 15: 16—21

Hylotelephium mingjinianum (S. H. Fu) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 51. f. 3h. 1977. — *Sedum mingjinianum* S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 113. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 84. 图 1898. 1972. — *Sedum telephium* L. ssp. *alboroseum* (Baker) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 61, p. p., quoad pl. 23: 1. f. 242—247. 1930. excl. descr. et syn.; 湖北植物志 2: 61. 图 763. 1979.

多年生草本,无毛。茎直立,高20—40厘米,不分枝。叶互生,上部的线形,长2厘米,宽2毫米,下部的椭圆状倒卵形,长8.5厘米,宽3厘米,先端急尖,基部渐狭,边缘上部波状钝齿状,下部全缘。花序顶生,伞房状,密集,长7厘米,宽10厘米;萼片5,长圆状披针形,长2—2.5毫米,宽0.7毫米;花瓣5,紫色,倒卵状长圆形,长5毫米,宽1.7毫米,急尖,直立开展;雄蕊10,长5毫米;鳞片5,匙状长方形,先端圆,基部稍呈楔形,长较宽为长;心皮5,直立,卵形,长5毫米,分离,基部有柄,柄长1毫米,花柱长1毫米。种子小,线形,长1毫米,褐色。 果期10月。

产广西、湖南、湖北、安徽、浙江。生于海拔700米的山间溪边阴湿处。模式标本采自安徽黄山。


全草药用,可活血生肌,止血解毒。

12. 白八宝 白景天(东北植物检索表),白花景天、长茎景天(拉汉种子植物名称)

Hylotelephium pallescens (Freyn) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 51. 1977. — *Sedum pallescens* Freyn in Öst. Bot. Zeitschr. 45: 317. 1895; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 62. pl. 4. f. 2. 1939; 中国高等植物图鉴 2: 85. f. 1899. 1972. — *Sedum telephium* L. var. *albiflorum* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 29: 142. 1883; 刘慎谔等,东北植物检索表 128. 1959; Fl. Coreana 3: 57. 1974. — *Sedum telephium* L. var. *pallescens* (Freyn) Kom. in Acta Hort. Petrop. 22: 393. 1904. — *Sedum telephium* L. var. *eupatorioides* Kom. in l. c. 22: 393. 1904; 刘慎谔等,东北植物检索表 128. 图版 34. 图 3. 1959; Fl. Coreana 3: 57. 1974. — *Sedum albiflorum* (Maxim.) Maxim. ex Kom. et Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. URSS. 1: 596. 1930. — *Sedum eupatorioides* (Kom.) Kom. in Kom. et Klob.-Alis. l. c. 1: 601. 1930; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 63. 1939. — *Hylotelephium eupatorioides* (Kom.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 50. 1977.

多年生草本。根状茎短,直立。根束生。茎直立,高20—60(—100)厘米。叶互生,有时对生,长圆状卵形或椭圆状披针形,长3—7(—10)厘米,宽7—25(—40)毫米,先端圆,基部楔形,几无柄,全缘或上部有不整齐的波状疏锯齿,叶面有多数红褐色斑点。复伞房花序,顶生,长达10厘米,宽达13厘米,分枝密;花梗长2—4毫米;萼片5,披针状三角形,长1—2毫米,先端急尖;花瓣5,白色至浅红色,直立,披针状椭圆形,长4—8毫米,宽1.8毫米,先端急尖;雄蕊10,对瓣的稍短,对萼的与花瓣同长或稍长;鳞片5,长方状楔形,长1毫米,先端有微缺。蓇葖直立,披针状椭圆形,长约5毫米,基部渐狭,分离,喙短,线形;种子狭长圆形,长1—1.2毫米,褐色。 花期7—9月,果期8—9月。

产山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江。生于河边石砾滩子及林下草地上。朝鲜、日本、蒙古、苏联也有。模式标本采自西伯利亚南部(达呼里亚)。



1—5. 圆扇八宝 *Hylotelephium sieboldii* (Sweet ex Hk.) H. Ohba: 1. 植株; 2. 萼片; 3. 花瓣及雄蕊; 4. 鳞片; 5. 心皮。6—10. 珠芽八宝 *Hylotelephium viviparum* (Maxim.) H. Ohba: 6. 花枝; 7. 萼片; 8. 花瓣及雄蕊; 9. 鳞片; 10. 心皮。11—15. 八宝 *Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba: 11. 花枝; 12. 萼片; 13. 花瓣及雄蕊; 14. 鳞片; 15. 萼囊。16—21. 紫花八宝 *Hylotelephium mingjinianum* (S. H. Fu) H. Ohba: 16. 植株; 17. 萼片; 18. 花瓣及雄蕊; 19. 鳞片; 20. 心皮; 21. 种子。(钱存源绘)