

多年生草本,无毛。茎直立,高20—40厘米,不分枝。叶互生,上部的线形,长2厘米,宽2毫米,下部的椭圆状倒卵形,长8.5厘米,宽3厘米,先端急尖,基部渐狭,边缘上部波状钝齿状,下部全缘。花序顶生,伞房状,密集,长7厘米,宽10厘米;萼片5,长圆状披针形,长2—2.5毫米,宽0.7毫米;花瓣5,紫色,倒卵状长圆形,长5毫米,宽1.7毫米,急尖,直立开展;雄蕊10,长5毫米;鳞片5,匙状长方形,先端圆,基部稍呈楔形,长较宽为长;心皮5,直立,卵形,长5毫米,分离,基部有柄,柄长1毫米,花柱长1毫米。种子小,线形,长1毫米,褐色。 果期10月。

产广西、湖南、湖北、安徽、浙江。生于海拔700米的山间溪边阴湿处。模式标本采自安徽黄山。

全草药用,可活血生肌,止血解毒。

12. 白八宝 白景天(东北植物检索表),白花景天、长茎景天(拉汉种子植物名称)

Hylotelephium pallescens (Freyn) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 51. 1977. — *Sedum pallescens* Freyn in Öst. Bot. Zeitschr. 45: 317. 1895; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 62. pl. 4. f. 2. 1939; 中国高等植物图鉴 2: 85. f. 1899. 1972. — *Sedum telephium* L. var. *albiflorum* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 29: 142. 1883; 刘慎谔等,东北植物检索表 128. 1959; Fl. Coreana 3: 57. 1974. — *Sedum telephium* L. var. *pallescens* (Freyn) Kom. in Acta Hort. Petrop. 22: 393. 1904. — *Sedum telephium* L. var. *eupatorioides* Kom. in l. c. 22: 393. 1904; 刘慎谔等,东北植物检索表 128. 图版 34. 图 3. 1959; Fl. Coreana 3: 57. 1974. — *Sedum albiflorum* (Maxim.) Maxim. ex Kom. et Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. URSS. 1: 596. 1930. — *Sedum eupatorioides* (Kom.) Kom. in Kom. et Klob.-Alis. l. c. 1: 601. 1930; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 63. 1939. — *Hylotelephium eupatorioides* (Kom.) H. Ohba in Bot. Mag. Tokyo 90: 50. 1977.

多年生草本。根状茎短,直立。根束生。茎直立,高20—60(—100)厘米。叶互生,有时对生,长圆状卵形或椭圆状披针形,长3—7(—10)厘米,宽7—25(—40)毫米,先端圆,基部楔形,几无柄,全缘或上部有不整齐的波状疏锯齿,叶面有多数红褐色斑点。复伞房花序,顶生,长达10厘米,宽达13厘米,分枝密;花梗长2—4毫米;萼片5,披针状三角形,长1—2毫米,先端急尖;花瓣5,白色至浅红色,直立,披针状椭圆形,长4—8毫米,宽1.8毫米,先端急尖;雄蕊10,对瓣的稍短,对萼的与花瓣同长或稍长;鳞片5,长方状楔形,长1毫米,先端有微缺。蓇葖直立,披针状椭圆形,长约5毫米,基部渐狭,分离,喙短,线形;种子狭长圆形,长1—1.2毫米,褐色。 花期7—9月,果期8—9月。

产山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江。生于河边石砾滩子及林下草地上。朝鲜、日本、蒙古、苏联也有。模式标本采自西伯利亚南部(达呼里亚)。