

产我国台湾高山山顶海拔 3000—3900 米处。未见标本,根据文献描写。模式标本采自台湾玉山。

存 疑 种

15. 承德八宝

Hylotelephium mongolicum (Franch.) S. H. Fu, comb. nov.——*Sedum fabaria* Koch var. *mongolica* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris II. 6: 10. 1883. (Pl. Dav. 1: 130. 1884); Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 287. 1887.

植株矮小,高 15—25 毫米。叶卵形,下部稍渐狭,中上部边缘有疏圆齿。伞房状花序平顶;花小,直径 5—6 毫米,带紫色或白色;花瓣披针形,急尖,自中下部反折;雄蕊着生花瓣基部稍上处,稍超出花瓣上,花药带紫色;心皮直立,卵形。

产河北承德。未见标本,根据原记载描述。

承德景天即如 Hemsley 已指明的那样,为紫景天或白景天一类植物。但我们未见标本。原始描述未记根的形状,叶是互生还是对生,且植株只有 15—25 毫米高,无法断定系统地位。留待以后研究。

6. 合景天属*——*Pseudosedum* (Boiss.) Berger

Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 465. 1930; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 99. 1939; id. in Not. Syst. Pl. Vasc. 6 (1969): 118. 1970; H. Ohba in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo III. 12: 167. 1978.——*Umbilicus* DC. sect. *Pseudosedum* Boiss. Fl. Orient. 2: 775. 1872.

多年生草本,无毛。根颈 (collum) 有少数小、膜质、三角形的叶。根绳索状或块状。花茎上密生叶,直立或自基部上升的,不分枝,有时老枝宿存。叶互生,肉质,长圆形至线形,圆柱状。伞状伞房状花序,花多数;萼片 5—6,基部稍合生;花冠浅红色或红色,干后呈金黄色,合生可至中部,漏斗状或钟状,5—6 裂;雄蕊 10—12;心皮 5—6,花柱细。蓇葖直立,披针形;种子多数,细小,常为长圆形,长约 1 毫米。

属的模式种:合景天 *Pseudosedum lievenii* (Ledeb.) Berger, 分布中国至苏联。

全属 10 种,分布中国、伊朗、苏联。我国有 2 种。

* 属的异名: 六瓣景天属(中国种子植物科属辞典),假景天属(中国高等植物图鉴)。