

心皮基部合生,宽,直立,花柱短。蓇葖通常有多数种子;种子小,平滑或有微乳头状突起。

组的模式种:小山飘风 *Sedum filipes* Hemsl., 模式产地宜昌。

全组 8 种,我国都有。

分 种 检 索 表

1. 多年生草本;植株小,丛生;雄蕊一轮……………2. 单花景天 *S. correptum* Fröd.
1. 一年或二年生草本;植株较大,单生或丛生;雄蕊二轮。
 2. 植株无毛。
 3. 心皮密被小乳头状突起,基部宽广。
 4. 茎直,不分枝;叶边缘有牙齿……………3. 南川景天 *S. rosthornianum* Diels
 4. 茎外倾的,分枝多;叶全缘……………4. 细叶景天 *S. elatinoides* Franch.
 3. 心皮无毛,长圆形。
 5. 心皮 3;萼片、花瓣、雄蕊为 4—5 基数……………5. 城口景天 *S. bonnierii* Hamet
 5. 心皮 5。
 6. 花紫色,花茎分枝,高 20 厘米……………6. 小山飘风 *S. filipes* Hemsl.
 6. 花白色,茎不分枝,高 10 厘米……………7. 山飘风 *S. major* (Hemsl.) Migo
 2. 植株被腺状毛。
 7. 一年生,茎软;叶大,长 4—4 厘米,宽 1.5—2.5 厘米……………8. 大叶火焰草 *S. drymarioides* Hance
 7. 二年生,茎褐色,略呈木质;叶小,长 1—1.5 厘米,宽 7—9 毫米……………9. 火焰草 *S. stellarifolium* Franch.

2. 单花景天(拉汉种子植物名称)

Sedum correptum Fröd. in Hand.-Mazz. Sym. Sin. 7: 409. Abb. 11. 1931; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 39. pl. 19; 3. f. 274—283. 1931, p. maj. p.; H. Ohba in Journ. Jap. Bot. 52: 306. 1977.

多年生草本,高 2—4 厘米。茎肉质,圆柱形,密被微乳头状突起,上升的,近直立,但基部横走。叶互生,密生,匙状狭倒卵形,长 5—6.5 毫米,宽 1.3—1.6 毫米,先端圆,基部无柄,无距,全缘,两面密被微乳头状突起。总状花序顶生或腋生,有 3—6 花疏生,苞片与叶相似而小;花两性,花梗长 1.5—2 毫米;萼片 5,绿色,狭长圆状披针形,长 1.6—2 毫米,宽 0.3—0.5 毫米,先端钝;花瓣 5,白色,狭椭圆形,长 3.2—3.5 毫米,宽 0.9—1.2 毫米,先端急尖;雄蕊 5,与花瓣互生,长 2.2—2.4 毫米,花药卵形,先端有微缺;鳞片 5,狭线状匙形,长 0.8 毫米,宽 0.3 毫米;心皮长 2.5—3 毫米,花柱长 0.5 毫米,每心皮有胚珠 8—10。蓇葖长 3.2—3.5 毫米;种子狭倒长圆形,长 1.3—1.4 毫米,有狭翅。花期 5 月下旬。

产四川盐源。生于海拔 4150—4300 米山坡石上。不丹也有。模式产在四川盐源。未见标本,根据文献描述。