

3. 南川景天(拉汉种子植物名称) 图版 19: 1

Sedum rosthornianum Diels in Bot. Jahrb. 29: 361. 1900; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 36. pl. 20. f. 249—256. 1931.

多年生草本? 植株无毛。花茎不分枝, 直立, 高 15—25 厘米。叶对生, 或 3—4 叶轮生, 叶菱状长圆形, 长 2—3.3 厘米, 宽 8—12 毫米, 先端近急尖, 基部急狭, 入于长 4—6 毫米的宽假叶柄, 边缘有浅锯齿 4—8。聚伞圆锥花序, 有稀疏的花, 长 5—10 厘米; 花梗长 3—8 毫米; 萼片 5, 狭三角形, 长 1—1.5 毫米, 有中脉 1 条, 基部合生; 花瓣 5, 白色, 半长圆形, 长 3—4 毫米, 先端渐尖, 稍钝, 基部宽广; 雄蕊 10, 对瓣的长 1.5 毫米, 在基部稍上着生, 对萼的长 2 毫米; 鳞片 5, 宽匙形, 长 0.6 毫米; 心皮 5, 宽卵形, 长 3 毫米, 花柱细, 长 1 毫米, 心皮外侧被微乳头状突起。种子多数, 卵形, 长 0.6 毫米。花期 6 月。

产四川南川、巫山至城口。生于海拔 1500 米的山坡草地上。模式标本采自四川南川。

4. 细叶景天(植物分类学报增刊) 疣果景天、小鹅儿肠、半边莲、崖松(秦岭植物志) 沟繁缕景天(拉汉种子植物名称) 图版 19: 2—7

Sedum elatinoides Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris II. 5, pl. 16. f. 2. 1883; 6: 10. 1883. (Pl. David. 1: 131. pl. 16. f. 2. 1884); Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 36. pl. 21—22. f. 257—264. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 85. 图 1900. 1972; 秦岭植物志 2 卷 2 册: 415. 图 356. 1974; 湖北植物志 2: 63. 图 766. 1979.——**Sedum silvestrii** Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17: 280. 1910.


一年生草本, 无毛, 有须根。茎单生或丛生, 高 5—30 厘米。3—6 叶轮生, 叶狭倒披针形, 长 8—20 毫米, 宽 2—4 毫米, 先端急尖, 基部渐狭, 全缘, 无柄或几无柄。花序圆锥状或伞房状, 分枝长, 下部叶腋也生有花序; 花稀疏; 花梗长 5—8 毫米, 细; 萼片 5, 狭三角形至卵状披针形, 长 1—1.5 毫米, 先端近急尖; 花瓣 5, 白色, 披针状卵形, 长 2—3 毫米, 急尖; 雄蕊 10, 较花瓣短; 鳞片 5, 宽匙形, 长 0.5 毫米, 先端有缺刻; 心皮 5, 近直立, 椭圆形, 下部合生, 有微乳头状突起。蓇葖成熟时上半部斜展; 种子卵形, 长 0.4 毫米。花期 5—7 月, 果期 8—9 月。

产云南西北部(海拔 3400 米)、四川(1200—1800 米)、湖北(500 米)、陕西(400—1800 米)、甘肃文县碧口、山西。生于山坡石上。缅甸北部也有。模式标本采自陕西汉中。

全草药用, 清热解毒, 治痢疾。

5. 城口景天(秦岭植物志)

Sedum bonnierii Hamet in Rev. Gén. Bot. 25: 92. in obs. 1913; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 38. pl. 23. f. 265—273. 1931; 秦岭植物志 2 卷



1. 南川景天 *Sedum rosthornianum* Diels: 植株。 2—7. 细叶景天 *Sedum elatinoides* Franch.: 2. 植株; 3. 叶; 4. 萼片; 5. 花瓣及雄蕊; 6. 鳞片; 7. 心皮。 8—12. 山飘风 *Sedum major* (Hamet) Migo: 8. 植株; 9. 萼片; 10. 花瓣及雄蕊; 11. 鳞片; 12. 心皮。 13—18. 火焰草 *Sedum stellariifolium* Hance: 13. 植株; 14. 萼片; 15. 花瓣及雄蕊; 16. 雄蕊放大; 17. 鳞片; 18. 心皮。(蔡淑琴绘)