

2 册, 417. 1974.

多年生草本。植株无毛。茎匍匐, 分枝多, 长 5—20 厘米, 细弱, 簇生。叶 3—5 片轮生, 卵形至圆形, 长 5—9 毫米, 宽 2—7 毫米, 先端圆钝, 基部突狭, 全缘; 假叶柄长 1—7 毫米。花序近圆锥状, 有 4—5 花; 花梗细, 长 5—9 毫米。花的各部分不等数; 萼片 4—5, 宽三角形至半长圆形, 长 0.6—1.5 毫米, 有钝头; 花瓣 4—5, 倒卵形, 长 2—2.3 毫米, 有钝头; 雄蕊 8—10, 与花瓣稍同长或稍短; 鳞片 3, 细小, 线状匙形, 长 0.6 毫米; 心皮 3, 近直立, 长圆状卵形, 长 2.5—5 毫米, 基部合生, 花柱短。蓇葖腹面不隆起; 种子 3—8, 长圆形, 长 0.6 毫米。花期 8—9 月, 果期 10 月。

产四川城口及陕西南部米仓山及略阳。生于海拔 500—1400 米的林下石上。模式标本采自四川城口。

6. 小山飘风 豆瓣还阳(湖北)

Sedum filipes Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 284. pl. 7A. f. 1—3. 1887; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 34. pl. 19: 1. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 86, 图 1901. 1972; 秦岭植物志 2 卷 2 册 416. 1974; 湖北植物志 2: 63. 图 766. 1979.

一年生或二年生草本, 全株无毛。花茎常分枝, 直立或上升, 高 10—30 厘米。叶对生, 或 3—4 叶轮生, 宽卵形至近圆形, 长 1.5—3 厘米, 宽 1.2—2 厘米, 先端圆, 基部有距, 全缘, 有假叶柄长达 1.5 厘米。伞房状花序顶生及上部腋生, 宽 5—10 厘米; 花梗长 3—5 毫米; 萼片 5, 披针状三角形, 长 1—1.2 毫米, 钝; 花瓣 5, 淡红紫色, 卵状长圆形, 长 3—4 毫米, 先端钝; 雄蕊 10, 长 3—5 毫米; 鳞片 5, 匙形, 微小, 先端有微缺; 心皮 5, 披针形, 近直立, 长 3—4 毫米, 花柱长 1 毫米在内。蓇葖有种子 3—4 粒; 种子倒卵形, 长 1 毫米, 棕色。花期 8—10 月初, 果期 10 月。

产云南、四川、湖北、浙江、江苏、陕西、河南。生于海拔 800—2000 米的山坡林下。模式标本采自湖北宜昌。

7. 山飘风 图版 19: 8—12

Sedum major (Hemsl.) Migo in Bull. Shanghai Sci. Inst. 14: 293. 1944; 中国高等植物图鉴 2: 86. 图 1902. 1972.——*Sedum filipes* Hemsl. var. *major* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 284. 1887; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 35. pl. 19: 2. 1931; 秦岭植物志 2 卷 2 册: 416. 图 357. 1974; 湖北植物志 2: 64. 图 768. 1979.——*Sedum filipes* auct. non Hemsl.; H. Ohba in Hara et Williams, Enum. Flower. Pl. Nepal 2: 164. 1979.

小草本, 高 10 厘米, 基部分枝或不分枝。4 叶轮生, 叶圆形至卵状圆形, 一对大的长宽各 4 厘米, 小的一对常稍小或较小, 先端圆或钝, 基部急狭, 入于假叶柄, 或几无柄, 全缘。伞房状花序, 总梗长 1.5—3 厘米; 花梗长 3—5 毫米; 萼片 5, 近正三角形, 长 0.5 毫

米, 钝; 花瓣 5, 白色, 长圆状披针形, 长 3—4 毫米, 宽 1—1.2 毫米; 雄蕊 10, 长 3 毫米; 鳞片 5, 长方形, 长 0.8 毫米; 心皮 5, 椭圆状披针形, 长 3—4 毫米, 直立, 基部 1 毫米合生。种子少数。 花期 7—10 月。

产西藏、云南、四川、湖北、陕西。生于海拔 1000—2500 米(四川、云南、湖北、陕西)或 2700—4300 米(西藏)的山坡林下石上。模式标本采自湖北宜昌。

全草药用, 煎水服, 治鼻出血。

8. **大叶火焰草** 荷莲豆景天(拉汉种子植物名称), 毛佛甲草(台湾植物志)


Sedum drymarioides Hance in Journ. Bot. 3: 379. 1865; Hamet in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 139. 1913; Hamet in Bull. Soc. Bot. France 71: 1216. 1924; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 40. p. maj. p., excl. syn. Franchetiana, pl. 24: 1. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 87. 图 1904. 1972; Liu, T. S. et N. J. Chung in Fl. Taiwan 3: 16. 1977; 湖北植物志 2: 62. 图 764. 1979.——*Sedum drymarioides* Hance var. *genuinum* Hamet in Bull. Soc. Bot. France 72: 51. sub nota, pl. III. 1, 2; pl. II. 4, 6, 9, 11. 1925. (sic!)——*Sedum uraiense* Hayata, Icon. Pl. Formos. 6: 20. f. 1916.

一年生草本。植株全体有腺毛。茎斜上, 分枝多, 细弱, 高 7—25 厘米。下部叶对生或 4 叶轮生, 上部叶互生, 卵形至宽卵形, 长 2—4 厘米, 宽 1.4—2.5 厘米, 先端急尖, 圆钝, 基部宽楔形并下延成柄, 叶柄长 1—2 厘米。花序疏圆锥状; 花少数, 两性; 花梗长 4—8 毫米; 萼片 5, 长圆形至披针形, 长 2 毫米, 先端近急尖; 花瓣 5, 白色, 长圆形, 长 3—4 毫米, 先端渐尖; 雄蕊 10, 长 2—3 毫米; 鳞片 5, 宽匙形, 先端有微缺至浅裂; 心皮 5, 长 2.5—5 毫米, 略叉开。种子长圆状卵形, 有纵纹。 花期 4 月(福建以南)至 5—6 月(浙江等省), 果期 8 月。

产广西、广东、台湾、福建、湖北东部、湖南、江西、安徽、浙江、河南商城。生于海拔 940 米以下低山阴湿岩石上。模式标本采自广东肇庆七星岩。

9. **火焰草** 繁缕景天、卧儿菜(北京植物志), 繁缕叶景天(东北植物检索表) 图版 19: 13—18

Sedum stellariifolium Franch. in Nuov. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris II 7: 10. 1883 (Pl. David. 1: 130. 1884); 刘慎谔等, 东北植物检索表 126. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 87. 图 1903. 1972; 秦岭植物志 2 卷 2 册: 417. 1974; 湖北植物志 2: 62, 图 765. 1979.——*Sedum drymarioides* Hance var. *stellariaefolium* (Franch.) Hamet in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 151. 1913; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 1: 38. 1924; Hamet in Bull. Soc. Bot. France 71: 1221. 1924; 72: 51. pl. II: 1, 2, 3, 7, 10, 12. pl. III: 3. 1925; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 40. pl. 24: 2—3. f. 284—291. p. maj. p., excl. pl. Kiangsi. 1931; Laue-



1. 南川景天 *Sedum rosthornianum* Diels: 植株。 2—7. 细叶景天 *Sedum elatinoides* Franch.: 2. 植株; 3. 叶; 4. 萼片; 5. 花瓣及雄蕊; 6. 鳞片; 7. 心皮。 8—12. 山飘风 *Sedum major* (Hamet) Migo: 8. 植株; 9. 萼片; 10. 花瓣及雄蕊; 11. 鳞片; 12. 心皮。 13—18. 火焰草 *Sedum stellariifolium* Hance: 13. 植株; 14. 萼片; 15. 花瓣及雄蕊; 16. 雄蕊放大; 17. 鳞片; 18. 心皮。(蔡淑琴绘)