

形,长 0.7—0.8 毫米,先端钝或微凹;心皮长圆形,长 5—8 毫米,有胚珠 4—9,基部合生 2—3 毫米。种子卵形,长约 1 毫米,有乳头状突起。花期 8—9 月,果期 10 月。

产河南西部(卢氏)、陕西南部(太白山、光头山)、四川、云南。生于山坡林下或山谷岩石上。模式标本采自陕西。

22. **盔瓣景天**(植物分类学报) 图版 21: 26—32

Sedum subgaleatum K. T. Fu, 植物分类学报 12: 56. 图版 11: 1—7. 1974.

一年生草本,无毛,高 4.5—7 厘米。花茎直立,分枝帚状,枝上密生叶。叶宽线形或长圆形,下部的较小,长 2—6.5 毫米,宽 1—1.5 毫米,先端近渐尖,基部有宽和 3 浅裂的距。花序伞房状,有花 3—5;苞片叶形。花为不等的五基数;花梗长 0.5—1.5 毫米;萼片披针状长圆形,长 4.5—4.8 毫米,宽 1.2—1.5 毫米,先端渐尖,基部无距;花瓣黄色,近长圆形,长 4.5—5 毫米,宽 1.5—1.7 毫米,先端近尖和近盔状,基部合生约 0.5 毫米;雄蕊 10, 2 轮,外轮的长 4—4.2 毫米,内轮的生于距花瓣基部约 1 毫米处,长约 2.5 毫米;鳞片线状匙形,长约 1 毫米,上部扩张近圆形,先端微缺;心皮直立,常有胚珠 8。花期 8—9 月。

产云南西北部。生于岩石上,海拔 4000 米。模式标本采自丽江。

23. **方腺景天**(植物分类学报)

Sedum susannae Hamet in Repert. Sp. Nov. 8: 24. 1910; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 1: 35. pl. 14: 3. f. 3: 1. 1924; l. c. 6. Append.: 62. pl. 33: 1—4. 1931; Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 456. 1930; 傅坤俊,植物分类学报 12: 57. 1974.

23a. **方腺景天**(原变种) 图版 22: 1—9

Sedum susannae Hamet var. **susannae**

二年生草本? 无不育茎。根纤维状。花茎直立或上升,高 4—12 厘米,稍纤细,基部多分枝。叶线状披针形或长圆形,长 4—9 毫米,宽 1—2.2 毫米,先端渐尖,基部有钝或 3 裂的距。花序伞房状,稍密集;苞片叶状;花为不等的五基数;花梗长 0.8—1.5 毫米;萼片线状披针形,长 3.8—5.6 毫米,宽 1.1—1.5 毫米,先端渐尖,基部无距;花瓣长圆状披针形,长 5.5—7 毫米,宽 1.6—1.8 毫米,基部合生 0.3—0.5 毫米或近离生,先端有长突尖头;雄蕊 10, 2 轮,外轮的长约 5 毫米,内轮的生于距花瓣基部 1—1.5 毫米处,长约 4 毫米;鳞片方楔形,长 0.4—0.8 毫米,先端微凹或钝形;心皮长圆形,直立,长约 6 毫米,合生 1—1.5 毫米,先端狭为长 0.8—1 毫米的花柱,有多数胚珠。种子长圆形,长约 1 毫米。花期 8—9 月,果期 9—10 月。

产四川西部至西北部(康定、道孚、炉霍、甘孜、马尔康、松潘、阿坝)。生于山坡岩石裸露处或石墙上,海拔 2100—3800 米。模式标本采自四川西部。

23b. **大萼方腺景天**(变种) 方腺景天大萼变种(植物分类学报)