

上有锈色斑点;花瓣黄色,线状披针形,长6.5—7.5毫米,宽2.4—2.8毫米,先端有短突尖头,基部稍狭而合生0.8—1.3毫米;雄蕊10,2轮,外轮的长5—6.5毫米,内轮的生于距花瓣基部2—3.5毫米处,长2.5—3.5毫米;鳞片线形,长0.7—1毫米,上部微扩张。心皮长圆形,长5.8—7毫米,宽1.5—1.7毫米,合生0.5—1毫米,先端渐尖为花柱,有胚珠8—10。种子倒卵形,长约0.8毫米,有乳头状突起。花期10月。

产四川西南部(木里)、云南西北部(大理、中甸)。生于高山顶部岩石上,海拔3200—4000米。模式标本采自云南西北部。

28. 细叶山景天 细叶景天(植物分类学报)

Sedum franchetii Grande in Bull. Ort. Bot. Napoli 4: 364. 1914; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 62. pl. 36; 2. f. 447—454. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 59. 1974. — *S. tenuifolium* Franch. in Journ. de Bot. 10: 407. 1894, non Strobl 1884.

一年生草本,无毛。根纤维状。花茎稍粗壮,直立,高10—13厘米,生多数叶。叶线状披针形,长5—10毫米,宽约1毫米,有短距,先端近尖。花序伞房状,多花;苞片叶形。花为不等的五基数;花梗长1—3毫米;萼片披针形或线状长圆形,稍不等长,长4.5—5毫米,宽1—1.2毫米,有钝距,先端近尖;花瓣黄色,披针状匙形,长4—4.5毫米,宽约1.1毫米,中部狭而离生,先端钝;雄蕊10,2轮,外轮的长约4毫米,内轮的生于距花瓣基部2毫米处,长约1.6毫米;鳞片狭线形,长约1.5毫米,先端钝;心皮长约3.5毫米,合生约1毫米,先端狭为花柱,有胚珠多数。种子倒卵形,长0.3—0.4毫米,有乳头状突起。花期7—8月,果期9—10月。

产云南西北部(兰坪、鹤庆、丽江)。生于丛林下或水旁岩石上,海拔2800—3700米。模式标本采自丽江。

29. 甘南景天(植物分类学报) 图版 22: 29—36

Sedum ulricae Fröd. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris II. 1: 442. 1929; id. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 65, pl. 38; 2, f. 471—479. 1931; l. c. 7; Append.: 115. f. 950—957. 1932; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 59. 1974; 秦岭植物志 2卷2册: 420. 1974.

一年生草本,无毛。根纤维状。花茎直立,高3—6厘米,下部有时拱形。叶宽线形至近长圆形,长5—7.5毫米,有短距,先端略急尖。花序伞房状,有少数花。花为同基数或不等的五基数;花梗长2—2.4毫米;萼片线形至倒披针形,长4.5—5毫米,有钝形短距,先端近尖;花瓣披针形,长约4毫米,宽1—1.2毫米,先端微钝,基部离生;雄蕊5或10,较花瓣短,如为10则外轮的长2.1—2.6毫米;鳞片狭线形,长1.1—1.2毫米,先端微缺;心皮近开展,长2.7—3.2毫米,先端突狭为短花柱,基部合生1.2—1.3毫米,有胚珠5—6。种子狭卵状长圆形,长约1毫米,有浅槽和小乳头状突起。花期7月,果期8月。