

花为不等的或相等的五基数，有短花梗；萼片倒卵形，长 2.5—7 毫米，宽 0.6—3 毫米，有钝距，前缘有时有乳头状突起，先端极钝；花瓣黄色，半长圆或宽三角形，长 3.5—5 毫米，宽 1.2—2 毫米，先端近尖，基部略合生；雄蕊 5 或 10，如为 10 则内轮的生于距花瓣基部约 1 毫米处；鳞片线状匙形，有线状爪；心皮直立，长 4—4.5 毫米，基部颇宽和合生约 1 毫米，先端渐狭为较短的花柱，有多数胚珠。种子倒卵状长圆形，长 0.5—0.6 毫米，有乳头状突起。 花果期 8—10 月。

产云南西北部。生于海拔 2500 米。模式标本采自邓川。我们尚未采到标本，描述是从原文献翻译过来的。

39. 倒卵叶景天(植物分类学报)

Sedum morotii Hamet in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 15: 491. 1909; Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 457. 1930; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 68. pl. 40: 1. f. 498—506. 1931; et in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 411. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 61. 1974.

39a. 倒卵叶景天(原变种) 图版 24: 1—9

Sedum morotii* Hamet var. *morotii

二年生草本，无毛。根纤维状。花茎直立或上升，高 5—15 厘米，由下部开始分枝。叶倒卵形或倒卵状长圆形，长 6—22 毫米，宽 1.8—8 毫米，有钝距，前缘有乳头状突起，先端钝。花序伞房状，密生多数花；苞片叶形。花为不等的五基数；花梗长 0.4—0.8 毫米；萼片长圆形至近倒卵形，长 3.5—4.5 毫米，宽约 1.1 毫米，有钝距，先端钝；花瓣黄色，狭长圆形，长约 6 毫米，宽 1.2—1.3 毫米，先端有突尖头，下部较狭，基部合生约 0.3 毫米；雄蕊 10，2 轮，外轮的长约 4.3 毫米，内轮的生于距花瓣基部 1.6 毫米处，长约 3 毫米；鳞片宽线状匙形，长 0.5—0.6 毫米，先端凹；心皮长圆形，长 5.5—6 毫米，先端狭为长约 1.5 毫米花柱，基部合生 1—1.5 毫米，有多数胚珠。种子倒卵形，长约 1 毫米，有乳头状突起。 花期 8—9 月，果期 10 月。

产四川西部(泸定、康定、宝兴、丹巴、马尔康)、西藏南部(拉萨)。生于路旁，海拔 1300—2800 米。模式标本采自四川康定。

39b. 小倒卵叶景天(变种) 倒卵叶景天小型变种(植物分类学报)

***Sedum morotii* Hamet var. *pinoyi* (Hamet) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 69. pl. 41: 2. f. 507—514. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 61. 1974.——*S. pinoyi* Hamet in Bull. Soc. Bot. Geneve Sér. 2. 11: 149. 1919.**

叶长 3.6—8 毫米，缘无乳头状突起；萼片较短而等长；花瓣长约 5 毫米，先端显有突尖头。 花期 8—9 月，果期 9—10 月。

产四川西部(巴塘、康定)。生于山坡林下岩石上，海拔 1300 米。模式标本采自巴塘。

40. 大花景天(植物分类学报) 图版 24: 10—18