

端渐尖,基部有3裂之距。花序聚伞状,密集,长8—23毫米;苞片叶状。花为不等的五基数,小形,多数;花梗长0.8—1.3毫米;萼片卵状线形,无毛,长3.5—5.6毫米,先端渐尖,基部有钝距,全缘而有小乳头状突起;花瓣卵状披针形,长5.6—7.3毫米,合生部分0.4—0.5毫米,先端尖而有突尖头,中部以下渐狭为亚爪状;雄蕊10,2轮,外轮的长4—5.7毫米,内轮的生于距花瓣基部1.3—2毫米处,长2.1—2.6毫米;鳞片有爪,长0.45—0.55毫米,宽0.3—0.4毫米,近四方形,深凹;心皮长4.2—4.6毫米,合生2.3—2.5毫米,含多数胚珠,先端渐狭入花柱。蓇葖斜向叉开,含多数种子。花果期8月。

产我国西藏与尼泊尔、锡金接壤的地方。海拔5000米。我们尚未采到标本,描述是从原文献摘译过来的。

42. 箭瓣景天(植物分类学报)

Sedum sagittipetalum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 15: 15. pl. 4: 5. 1942; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 62. 1974.

多年生草本,丛生,无毛。根小头状,近肥厚,有小的初生根。不育茎丛生,长0.5—1厘米;叶密集,宽倒披针形,长2—4毫米,有钝短距,先端渐尖,干后亮绿或淡灰白色。花茎直立,长1—2厘米;叶覆瓦状排列,长4—6毫米,有钝或浅裂距,先端长渐尖。花序有1或2花;苞片2,叶状。花为不等的五至七基数;萼片倒披针形或长圆形,长4—4.5毫米,无距,先端长渐尖;花瓣长6—6.5毫米,爪狭几达中部,离生,瓣片近卵形,中部以上渐狭,有长细尖头,干后黄色;雄蕊2轮,内轮的生于距花瓣基部2—2.5毫米处,外轮的长约4毫米;鳞片上部扩张,微缺,长1—0.7毫米,宽0.4—0.5毫米。心皮直立,披针形或宽披针形,长4—4.5毫米,花柱极短,有多数胚珠,胎座一般形。种子卵圆形,长约1毫米,两侧有翅,光秃? 花期8月,果期9月。

产四川西部。生于冰谷悬崖上,海拔4300—4500米。模式标本采自道孚。我们尚未采到标本。描述是从原文献翻译过来的。

43. 钹瓣景天(植物分类学报)

Sedum trullipetalum Hk. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 102. 1858; C. B. Clarke in Hk. f. Fl. Brit. Ind. 2: 421. 1878; Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 456. 1930; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 43. pl. 26: 2—5. f. 299—307. 1931; id. in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 410. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 62. 1974.

43a. 钹瓣景天(原变种) 图版24: 19—27

Sedum trullipetalum Hk. f. et Thoms. var. ***trullipetalum***

多年生草本,无毛。不育茎密丛生,长1—4厘米;花茎不分枝或由基部分枝,高2.5—8厘米。叶半长圆形至狭三角形,长3—10毫米,有3裂的宽距,先端渐尖。花序伞房状,紧密。花为不等的五基数,几无花梗;萼片半长圆形或长卵形,长4—6.5毫米,无