

产四川西部至西北部(雅江、康定、义敦、丹巴、茂汶)。生于海拔2040—3600米。模式标本采自四川西部。

48. 隐匿景天(植物分类学报)

Sedum celatum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 7. Append.: 114. pl. 64. f. 938—948. 1932; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 65. 1974; 秦岭植物志 2卷2册: 419. 图360. 1974.——*S. wuianum* Hao in Bot. Jahrb. 68: 603, p. p. quoad specim. no. 1065, excl. no. 1025.

二年生草本,无毛。主根圆锥形。花茎直立,自基部分枝,高3—9厘米。叶披针形或狭卵形,长5—7毫米,有钝或近浅裂的距,先端渐尖。花序伞房状,有3—9花;苞片叶形。花为不等的五基数;花梗长2—6.5毫米,无距,先端长渐尖;花瓣黄色,披针形,长3.5—4.5毫米,合生0.2—0.3毫米,先端渐尖有长突尖头;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部0.5—0.7毫米处,外轮的长约3毫米;鳞片宽匙形,长约0.4毫米,宽约0.5毫米,先端微缺;心皮半长圆形,长3.5—3.8毫米,基部合生0.6—0.7毫米,有胚珠6—8;胎座镰刀形,上部外侧3—5裂。种子倒卵状长圆形,长0.7—1毫米,有狭翅及乳头状突起。花期7月,果期8—9月。

产甘肃南部(夏河、卓尼、临夏)、青海东部(泽库、兴海、同仁)。生于干山坡或山坡上,海拔2900—4000米。模式标本采自甘肃洮河附近。

49. 高原景天(植物分类学报)

Sedum przewalskii Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 156. 1883; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 286. 1887; Limpr. in Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 392. 1922; Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 461. 1930; Fröd. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris II. 1: 422. 1929; id. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 73. pl. 38: 1. f. 541—558. 1931; l. c. 15: 24. 1942; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 65. 1974.

一年生草本,无毛。根纤维状。花茎直立,高1—4厘米,常自基部分枝。叶宽披针形至卵形,长2—4.8毫米,有截形宽距,先端钝。花序伞房状,有3—7花;苞片叶形。花为五基数;花梗长3—6毫米;萼片半长圆形,长约3毫米,无距,先端钝;花瓣黄色,三角状卵形,长3—3.5毫米,略合生,先端钝;雄蕊长约3毫米;鳞片狭线形或近线状匙形,长0.8—1.3毫米,先端近钝形;心皮近菱形,长3.2—3.4毫米,离生或合生0.2—0.5毫米,有胚珠3—6;胎座镰刀形。种子卵状长圆形,长约0.8毫米,有小乳头状突起。花期8月,果期9月。

产甘肃(大通河)、青海(杂多、久治、兴海、循化、大通)、四川(理塘、康定、义敦、道孚、甘孜)、云南(德钦)、西藏(错那、察隅、朗县、达孜、拉萨、安多)。生于高山坡干草地或岩石上,海拔2400—5400米。模式标本采自青海大通河沿岸。