

50. 寒地景天(植物分类学报)

Sedum pagetodes Fröd. in Acta Hort. Gothob. 15: 25. pl. 4: 3. f. 152—163. 1942; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 65. 1974.

一年生草本,无毛。花茎直立或上升,高2—4厘米,自基部分枝。叶宽线形或长圆形,长2.5—4.8毫米,有截形宽距,先端钝。花序伞房状,有花4—12;苞片叶形。花为不等的五基数;花梗长1—3毫米;萼片近卵形或宽披针形,长2.8—3毫米,无距,先端钝,有黑褐色斑点;花瓣黄色,近长圆形,长3.7—4毫米,下部稍狭,略合生,先端钝有不显的短突尖头;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部约1.2毫米处,外轮的长2.9—3.2毫米;鳞片线状匙形,长约0.7毫米,先端钝;心皮倒卵形,长2.8—3毫米,微合生,有胚珠2—3;胎座新月形。种子倒卵状长圆形,长0.9—1.2毫米,有乳头突起。花期8—9月,果期9月。

产四川西部(康定、道孚)及青海南部(杂多)。生于山坡草地上,海拔3700—4600米。模式标本采自道孚。

51. 牧山景天(植物分类学报)

Sedum pratoalpinum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 15: 24. f. 145—151. 1942; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 65. 1974.

一年生草本,无毛。根纤维状。花茎直立,高2—4厘米,自近基部分枝。叶长圆形,长3—5毫米,有宽钝距,先端钝。花序伞房状,有多数花;苞片宽披针形。花为不等的五基数,有长梗;萼片宽披针形,长约3毫米,无距,先端近尖;花瓣干后带白色,披针形,长约4毫米,基部宽,几离生,先端钝;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部1—1.2毫米处,外轮的较内轮的长;鳞片线状匙形,长约0.7毫米,先端钝;心皮倒卵形,长约3毫米,略叉开,基部合生,有长花柱,含胚珠1—3,胎座基生。种子近倒卵形,长1毫米,有乳头状突起。花果期8—9月。

产四川西部(巴丹)、青海南部(治多)。在模式产地尚未采到标本。生于高山草地或山顶裸露地,海拔4300米—4600米。模式标本采自四川丹巴。

52. 敏感景天(植物分类学报) 图版26: 1—7

Sedum paracelatum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 15: 17. pl. 4: 1. f. 83—91. 1942; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 65. 1974.

一年生草本,无毛。根纤维状。花茎直立,高6—10厘米,基部以上多分枝。叶披针形至长圆形,长4—7毫米,上部的较大,有钝近浅裂的距,先端急短细尖。花序伞房状,有少数花;苞片长圆形。花为不等的五基数;萼片长圆形,不等大,长4.2—6毫米,有钝距,先端尖,下面有暗红色斑纹;花瓣长圆形,黄色,长6—7毫米,合生约0.5毫米,先端有长突尖头;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部1毫米处,外轮的长4—4.5毫米;鳞片长圆状匙形,长约0.45毫米,先端钝;心皮近直立,长圆形,长5—5.5毫米,合生1.5—1.8