

毫米,有胚珠10—12; 胎座镰刀形。种子近卵圆形,长约8毫米,有乳头状突起。花期8—9月,果期9—10月。

产四川西部(康定、道孚)。生于阳坡草地上,海拔3600—4200米。模式标本采自道孚。

53. 禄劝景天(植物分类学报) 图版26: 8—17

*Sedum luchuanicum* K. T. Fu, 植物分类学报 12: 65. 图版12: 10—19. 1974.

一年生草本,无毛。根纤维状。花茎直立,高5—9厘米,自基部分枝。叶钻形、线状披针形或狭三角状披针形,最下的最小,长1—7毫米,有宽而3浅裂或截形的距,先端渐尖,3—5脉,沿脉两侧有褐色斑点。花序伞房状,有花3—9; 苞片叶形。花为不等的五基数,偶为六基数; 花梗长3—4毫米; 萼片线状披针形或半披针形,长5.8—7.5毫米,有长钝距,先端渐尖,3—5脉,沿脉两侧有褐色斑点; 花瓣紫红色,线状披针形,长9—10.5毫米,合生0.3—0.7毫米,先端有长突尖头; 雄蕊10—12,内轮的生于距花瓣基部2.5—3毫米,外轮的长6—6.8毫米; 鳞片宽匙形,长0.7—0.8毫米,先端钝; 心皮直立,披针形,长8—10毫米,离生,有胚珠7—9; 胎座近新月形。种子倒卵形,长1.2—1.4毫米,有少数乳头状突起。花期9—10月,果期11月。

产云南。生于石隙中,海拔4400米。模式标本采自禄劝乌蒙山。

54. 尖叶景天(植物分类学报)

*Sedum fedtschenkoi* Hamet in Journ. Russe Bot. 1914: 2. 1914; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 59. pl. 35; 1. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 66. 1974.

一年生草本。花茎上升,长2.5—4.5厘米,自基部分枝。叶线状披针形,长4.7—8毫米,有钝距,先端尖。花序伞房状,较疏松,有少数花; 花为不等的五基数; 萼片披针形至近倒卵形,长3—5毫米,有距,先端尖; 花瓣黄色,近长圆形,长约4毫米,近离生,先端短渐尖; 雄蕊10, 2轮,内轮的生于距花瓣基部0.8—1毫米处,长约1.5毫米,外轮的长约2.8毫米; 鳞片近圆状匙形,长约0.5毫米,先端圆或凹; 心皮直立,宽卵形,长3—3.5毫米,合生0.8—0.9毫米,先端突狭为花柱,有胚珠3—8; 胎座镰刀形。种子卵形,长0.8—1毫米,有小乳头状突起。花期8月,果期9月。

产四川西部(巴塘、义敦、道孚、甘孜)、西藏东部(乃东、拉萨、林周、聂荣、索县)、青海南部(囊谦、玉树)。生于河滩草甸上,海拔3800—4500米。模式标本采自西藏拉萨以北。

55. 裂鳞景天(植物分类学报)

*Sedum purdomii* W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. 9: 126. 1916; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 73. pl. 38; 3. f. 559—566. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 66. 1974.

一年生草本,无毛。花茎直立,高4.5—5.5厘米,基部分枝或不分枝。叶线状长圆形

或长圆形,长4—5毫米,有截形短距,先端钝。花序伞房状,有10余花;花为不等的五基数;花梗长1—4毫米;萼片长圆形,长2—3毫米,有短距,先端钝;花瓣黄色,狭倒披针形,长4.5—5毫米,先端稍钝,有短尖头;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部约1毫米处,与花瓣等长;鳞片宽线状匙形,长0.7毫米,宽0.6毫米,先端有深裂或浅圆裂;心皮宽,略叉开,长3—4毫米,合生约1毫米,有胚珠2—4;胎座镰刀形。种子下部有狭翅,具高乳头状突起。花期8月。

产甘肃文县碧口。生于高山砾石地上,海拔3700—4000米。模式标本产在甘肃岷山北坡。

56. 景东景天(植物分类学报) 图版26: 18—26

*Sedum chingtungense* K. T. Fu, 植物分类学报 12: 67. 图版10: 1—9. 1974.

一年生草本,无毛。花茎平铺,长4—15厘米。叶近基部的匙形,长约1厘米;其余的近提琴形,长4—8毫米,有宽钝距,先端钝。花单生,不等的五基数;萼片狭长圆形或近倒披针状长圆形,长4.5—6毫米,有钝距,先端钝;花瓣黄色,近倒卵形,长5.8毫米,下部略狭,基部合生,先端钝;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部约2毫米处;鳞片线形,长1—1.2毫米,上部略扩张,先端微凹;心皮略叉开,长圆形,长4—5毫米,合生1.2—1.8毫米,有多数胚珠;胎座新月形。种子倒卵形,长约0.75毫米,有乳头状突起,珠柄弯曲。花期4月,果期5月。

产云南中部。生于水井旁,海拔2100米。模式标本采自景东无量山。

57. 冰川景天(植物分类学报)

*Sedum sinoglaciale* K. T. Fu, 植物分类学报 12: 67. 1974.——*S. glaciale* Franch. in Morot Journ. de Bot. 10: 290. 1896, non Clarion ex DC. 1828; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 74. f. 567—576. 1931.

一年生草本,无毛。花茎直立或上升,高1.5—3厘米,自基部分枝。叶线形或线状长圆形,长4—7毫米,有距,先端近钝。花序伞房状,有1—3花;苞片叶形。花为不等的五基数;花梗长3—7毫米;萼片长圆形或线状长圆形,长5—7毫米,有截形或钝形距,先端尖,6—8脉;花瓣黄色,近倒卵形,长7—7.5毫米,合生0.5—0.8毫米,先端钝,有极短突尖头;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部约2毫米处,外轮的长5.5—6毫米;鳞片匙形,长1—1.5毫米,近基部较宽,先端微凹;心皮直立,长圆形,长约7毫米,几离生,花柱长约1.8毫米,有胚珠5;胎座镰刀形,但无柄。种子长圆形,长约1毫米,有乳头状突起。花期8月,果期9月。

产云南西北部(丽江、中甸)。生于山坡或山麓,海拔3000—4700米。模式标本采自丽江。

58. 月座景天(植物分类学报) 图版26: 27—35

*Sedum semilunatum* K. T. Fu, 植物分类学报 12: 67. 图版10: 10—18. 1974.