

59. 糠秕景天(植物分类学报) 图版 26: 36—43

Sedum ramentaceum K. T. Fu, 植物分类学报 12: 71. 图版 10: 26—35. 1974.

二年生草本,无毛。花茎直立,高0.8—1.2厘米,不分枝或基部少分枝,下部叶早落。叶淡黄绿色,最上部的线状长圆形或倒披针状长圆形,长3.5—5.5毫米,有宽距,先端钝或近尖。花序伞房状,有花1—3;苞片叶形。花为五基数或不等的五基数;花梗长1.5—3毫米;萼片半长圆形或狭卵形,长3—4.6毫米,无距,先端略尖;花瓣黄色,半长圆形,长3.8—5毫米,下部稍狭,离生,先端钝;雄蕊5或10,如为10则内轮的生于距花瓣基部1—1.4毫米处,长约2毫米,外轮的长2.5—3.8毫米;鳞片线形或近棒状,长0.8—1毫米,先端钝;心皮叉开,宽卵形,长2.5—4毫米,离生,有胚珠4—5;花柱长约0.8毫米。种子长圆形,长1—1.1毫米,有糠秕状突起。基部有胃状附属物,具长珠柄。花期7月,果期8月。

产四川西部。生于高山梁路上,海拔4500米。模式标本采自康定大炮山。

60. 毛籽景天(植物分类学报) 图版 27: 1—9

Sedum trichospermum K. T. Fu, 植物分类学报 12: 68. 图版 12: 1—9. 1974.


一年生草本,无毛。根纤维状。花茎直立或升,高2.5—5厘米,分枝或不分枝。叶线状或线状披针形,长2.5—7.1毫米,有距,先端近尖。花序伞房状,有少或多数花。花为不等的五基数;花梗长1—2.5毫米;萼片半长圆形,长约3毫米,无距,先端钝;花瓣近长圆形,长4—4.5毫米,离生或略合生,先端钝及近盔状;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部0.8—1毫米处,外轮的长约3.5毫米;鳞片线形或近线状匙形,先端钝;心皮叉开,长圆形,基部合生,有胚珠2—3;胎座新月形。种子有硬毛状突起,基部具胃状附属物,有长珠柄。花期8—9月,果期9—10月。

产四川西部。生于路旁草地,海拔4600米。模式标本采自甘孜座达山。

61. 绿瓣景天(植物分类学报)

Sedum prasinopetalum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 15: 20. pl. 5: 1. f. 110—117. 1942; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 69. 1974.

一年生草本,无毛。花茎直立或上升,不分枝或分枝,高3—7厘米。叶狭长圆形或宽披针形,长3—5毫米,有钝或近浅裂的距,先端钝或略尖。花序伞房状,有少数花;苞片宽倒披针形。花为不等的五基数,有长柄;萼片淡黄绿色,长圆形,长3—4.6毫米,无距,先端钝,有3—5脉,脉近黑色;花瓣黄色,干后绿黄色,近卵形,长5—6毫米,几离生,先端钝,向内弯;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部1.5—2毫米处;鳞片线状匙形,长0.4—0.75毫米,先端钝;心皮直立,干后绿色,长4—5毫米,基部宽,有胚珠12—14;胎座一般形。种子倒卵形,长0.5—0.7毫米,表面有小乳头状突起,基部具胃状附属物,有长珠柄。花期8—9月,果期9—10月。



1—7. 敏感景天 *Sedum paracelatum* Fröd.: 1. 植株; 2. 叶; 3. 萼片; 4. 花瓣及雄蕊; 5. 鳞片; 6. 心皮; 7. 种子。
 8—17. 禄劝景天 *Sedum luehuanicum* K. T. Fu: 8. 植株; 9. 下部叶; 10. 中部叶; 11. 上部叶; 12, 13. 萼片;
 14. 花瓣及雄蕊; 15. 鳞片; 16. 心皮; 17. 种子。18—26. 景东景天 *Sedum chingtungense* K. T. Fu: 18. 植株;
 19. 基生叶; 20. 中部叶; 21, 22. 萼片; 23. 花瓣及雄蕊; 24. 鳞片; 25. 心皮; 26. 种子。27—35. 月座景天 *Sedum semilunatum* K. T. Fu: 27. 植株; 28. 下部叶; 29. 中部叶; 30, 31. 萼片; 32. 花瓣及雄蕊; 33. 鳞片; 34. 心皮;
 35. 种子。36—43. 皱裂景天 *Sedum ramentaceum* K. T. Fu: 36. 植株; 37. 下部叶; 38, 39. 萼片; 40. 花瓣及雄蕊;
 41. 鳞片; 42. 心皮; 43. 种子。(祁世章绘)