

产四川西部(康定、道孚)及青海东南部(久治)。生于高山草地或岩石上,海拔4300—4500米。模式标本采自四川康定大炮山。

62. 川滇景天(植物分类学报) 图版 27: 10—17

*Sedum forrestii* Hamet in Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 118. 1912; id. in Acta Hort. Gothob. 2: 330. 1926; Fröd. in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 411. 1931; id. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 70. pl. 37: 1. f. 524—535. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 71. 1974.

二年生草本? 无毛。花茎直立或上升,高2—4厘米,自基部分枝。叶长圆形至近卵形,长4.5—10毫米,有截形距,先端钝。花序伞房状,密集,有多数花;苞片叶状。花为不等的五基数;花梗长约3.5毫米;萼片长圆形至倒卵形,长3.2—6.5毫米,有钝或截形距,先端钝;花瓣黄色,长圆形或半长圆形,长5.5—6毫米,几离生,先端钝;雄蕊10,2轮,生于距花瓣基部0.5—1.5毫米处;鳞片线形或近线状匙形,长1.6—1.8毫米,先端钝;心皮长圆形,长5—6.5毫米,合生0.5—1毫米,有胚珠3—5。种子长圆形,有小乳头状突起,先端有烟斗状长珠柄。花期7—8月,果期8—9月。

产云南西北部(丽江、中甸)。生于山巅或山坡岩石缝中,也见于裸岩或草地,海拔3300—4300米。模式标本采自云南丽江。

63. 甘肃景天(植物分类学报)


*Sedum perrotii* Hamet in Bull. Soc. Bot. France 71: 157. pl. 2. 1924; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 64. 1931; l. c. 15: 20. 1942; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 70. 1974.——*S. anthoxanthum* Fröd. l. c. 1: 36. pl. 15: 3. f. 3: 12—22. 1924.

一年生草本,无毛。根短纤维状。花茎直立,高2—6厘米,基部分枝。叶线状倒卵形或线状披针形,长4—8毫米,有短钝距,先端近尖或微钝。花序伞房状,有花5—15,稍密集;苞片叶状;花为不等的五基数;花梗长3—4毫米;萼片长圆形或线状披针形,长2.5—4.5毫米,有短钝距,先端近尖;花瓣黄色,近狭长圆形或近倒卵状长圆形,长4—6毫米,离生,先端钝;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部1—1.5毫米处;鳞片线状匙形,长0.5—0.7毫米,先端稍钝;心皮直立,披针形,长4.5—5毫米,合生0.6—1.6毫米,有胚珠4—5,具长花柱。种子卵形,长1.2毫米,有乳头状突起,具长珠柄。花期7月,果期8月。

产四川北部(松潘)、青海东南部(班玛)、甘肃西南部。生于高山阳坡草地上,海拔4000—4300米。模式标本采自甘肃西南部。

64. 长珠柄景天(植物分类学报) 图版 27: 18—26

*Sedum longifuniculatum* K. T. Fu, 植物分类学报 12: 70. 图版 10: 19—27. 1974.



1—9.毛籽景天 *Sedum trichospermum* K. T. Fu: 1.植株; 2.下部叶; 3.中部叶; 4.上部叶; 5.萼片; 6.花瓣及雄蕊; 7.鳞片; 8.心皮; 9.种子。10—17.川滇景天 *Sedum forrestii* Hamet: 10.植株; 11.下部叶; 12.上部叶; 13.苞片; 14.花瓣及雄蕊; 15.鳞片; 16.心皮; 17.种子。18—26.长珠柄景天 *Sedum longifuniculatum* K. T. Fu: 18.植株; 19.下部叶; 20.上部叶; 21.萼片; 22.花瓣及雄蕊; 23.花药; 24.鳞片; 25.心皮; 26.种子。27—34.轮叶景天 *Sedum chauveaudii* Hamet: 27.花茎; 28.上部叶; 29.下部叶; 30.萼片; 31.花瓣及雄蕊; 32.鳞片; 33.心皮; 34.种子。(祁世章绘)